

LÖVSKOGSINVENTERING BORÅS KOMMUN (del I)

Thomas Appelqvist

Bengt Andersson

Anders Ekstrand

Karl-Henrik Larsson

Inventering 1985 med komplettering 1988-89

REGIONALT
PLANERINGSUNDERLAG

ISSN 0347 – 8564

LÄNSSTYRELSEN I ÄLVSBORGS LÄN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	1
Metodik	3
Redovisning	5
Bedömning	7
Lövskogarna i Borås kommun	9
Naturgeografiska förutsättningar	9
Lövskogarnas utbredning och fördelning	10
Kortfattad beskrivning av de olika skogstyperna	10
Värdefull flora och fauna knuten till lövskogen	15
Litteratur	17
Sällsynta mossor och lavar i Borås kommun	19
Lövskogar i Borås kommun objektbeskrivningar	37

INLEDNING

Föreliggande inventering är utförd på uppdrag av miljövårdsenheten vid länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Flygbildstolkningen utfördes 1985 av Karl-Henrik Larsson.

Det huvudsakliga fältarbetet utfördes samma år av Bengt Andersson och Anders Ekstrand som fält har besökt samtliga bestånd. Vid detta fältarbete avgränsades bestånden och en blankett fylldes i som anger beståndets trädslagssammansättning, ålder och olika skogliga uppgifter. Dessa uppgifter har samlats i ett tabellhuvud för varje beskriven lokal i denna rapport (se objektredovisningen). I samband med detta fältarbete samlades även en del biologiska uppgifter in på en särskild blankett som värdefull flora, förekomst av hålträd, torrakor och lågor m.m.

Bestånden fick därefter en bedömning och klassades i tre olika naturvärdeskategorier.

Under maj 1988 och en novembervecka samma år besökte jag samtliga bestånd som hade fått bedömningen Klass 1 och 2. Min huvudsakliga uppgift var därvid att samla in ytterligare information om faunan och floran. Detta för att kunna ge dessa en klassning som överensstämmer med klassningen i de övriga lövskogsinventerade kommunerna i Älvsborgs län.

Då antalet bestånd, i förhållande till den stipulerade tiden - en månad - var väldigt många, har jag besökt ca 5 bestånd per dag. Detta räcker naturligtvis inte till att ge en uttömmande beskrivning av objektens kryptogamflora och många fler intressanta arter finns troligen kvar att upptäcka!

En hel del uppgifter om faunan och floran i de olika objekten har lämnats av olika personer, främst Tomas Hallingbäck, Thorbjörn Schafferer, Lars Arvidsson, Svante Hultengren och Karl-Henrik Larsson.

Ett stort antal lavar och mossor har bestämts av Leif Andersson, Värning. Några mossor har bestämts av Tomas Hallingbäck, Sveriges Lantbruksuniversitet.

En hel del litteraturuppgifter och uppgifter ur andra källor har också tillfogats då jag tycker att dessa bidrar med kriterier till beståndens slutgiltiga bedömning.

Den genomgångna litteraturen är:

Natur i Älvsborgs län, länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976, Söderberg & Sandberg 1936, Sandberg & Söderberg 1942, Larsson 1987, Löfgren & Moberg 1984.

Andra källor är:

Länsstyrelsens fauna- och floravårdsregister (detta har förkortats med LFF i objektredovisningen) och floravårdsregistret vid Sveriges Lantbruksuniversitet (vissa delar genom Tomas Hallingbäck).

METODIK

För flygbildstolkningen har använts svartvita bilder i skala 1:30 000 av så sent datum som möjligt. En första preliminär avgränsning av lövskogsbestånden gjordes i samband därmed på den ekonomiska kartan.

Avgränsningen preciserades sedan, också på den ekonomiska kartan, i samband med fältinventeringen av Andersson & Ekstrand.

Eftersom Anderssons och Ekstrands arbete samtidigt var ett pilotprojekt för inventering av ädellövskog under skogsvårdsstyrelsen har ädellövskogen inventerats tämligen fullständigt och den undre gräns på 2 hektar som gäller för de övriga kommunerna i länsstyrelsens inventeringsmetodik har inte tillämpats i Borås kommun. Även flygbildstolkningen har därvid utförts något noggrannare vad det gäller små bestånd än i det övriga länet.

Under detta fältarbete antecknades uppgifter om trädslagsfördelning, trädens grovlek och ålder, föryngring och eventuella skogsvårdsåtgärder. Vidare antecknades buskskiktets sammansättning och utseende liksom, i den mån tidpunkten på året tillät det, typ av fällskikt och intressanta lövskogsväxter.

Till sist antecknades ett stort antal företeelser som ansågs ha betydelse för naturvärdesbedömningen, både av positiv art såsom träd med bohål, lågor och torrakor, block, bergväggar,

vattendrag, skogsbryn samt intressant fauna eller flora och av negativ art såsom granplanteringar, avverkningar, gallringar, vägar, luftledningar etc.

För alla dessa uppgifter har konstruerats en särskild fältblankett samt dessutom en blankett för de skogliga uppgifterna.

Vid mitt fältarbete under 1988 antecknades i första hand sällsyntare, eller på annat sätt intressanta växter (och i någon mån djur).

En lång rad mossor och lavar samlades in för bestämning.

En lista över sällsyntare mossor och lavar har upprättats och bifogas som en bilaga. I denna lista har jag också tillfogat de äldre uppgifter som jag har kunnat finna för att ge en så fullständig bild som möjligt över dessa arters förekomst i kommunen.

För några lavar har jag också gjort prickkartor för att ge en översiktssbild över utbredningen.

I samband med fältarbetet gjordes en del justeringar av olika uppgifter från de upprättade fältblanketterna.

Särskild vikt har jag lagt vid att samla in information om de lövängsrester som finns med kommunen då uppgifterna om detta var mycket sparsam.

I några fall har jag också gjort justeringar i objektens avgränsningar och ett par helt nya objekt har tillfogats.

REDOVISNING

Till varje bestånd har lämnats en kort beskrivning. I denna har varje bestånd klassats i ett antal olika skogstyper. I vissa bestånd ingår mer än en skogstyp och detta har då angetts.

De skogstyper som är aktuella är:

1. Hedekskog (mer eller lika med 50% ek med ett fältskikt av ristyp)
2. Ängsekskog (mer eller lika med 50% ek med ett fältskikt av örtytp)
3. Alm-Ask-skog (alm och ask och lind utgör mer än 50%)
4. Bokskog (mer eller lika med 50% bok)
5. Blandskog med ädellövinslag (mer än 50% lövträd och minst 10% ädla lövträd)
7. Alskog (mer eller lika med 50% al)
8. Björkskog (mer eller lika med 50% björk)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 9. Blandskog av trivialtyp | (blandskog av asp, rönt., sälg, björk och al etc., sammantaget mer än 75%) |
| 10. Ekhage | (mer än 70% av hagmarksträden utgörs av ek) |
| 11. Björkhage | (mer än 70% av hagmarksträden utgörs av björk) |
| 12. Hagmark med blandade lövträd | (inget av hagmarksträden uppgår till 70%) |

Vid klassningen av de olika skogstyperna har naturligtvis en viss förenkling av verkligheten varit nödvändig och det har ofta inte varit möjligt att återge alla de variationer som finns i skogsbestånden. Ibland har en uppspaltning av det enskilda skogsbeståndet gjorts och delarna har då fått olika bokstavsbezeichnungar i beskrivningen och på den ekonomiska kartan.

De bestånd som är ädellövbekend i juridisk mening (mer än 50% ädla lövträd och mer än 70% lövinnehåll) har utmärkts genom att bokstäverna ÄL då står efter skogstypen. Faller endast delar av beståndet inom denna kategori står det på samma sätt delvis ÄL efter skogstypen.

Till de ädla lövträden (som förekommer i Borås kommun) räknas ask, alm, lind, skogslönn, ek, bok och fågelbär.

Efter skogstypsbedömningen följer en kort beskrivning av trädslagssammansättningen. Här har använts beteckningarna stort inslag (mer än 10%), inslag (ca 10%) och litet inslag (mindre än 10%). I samband med denna ges ibland en kort beskrivning av beståndet geomorfologiska, hydrologiska och landskapmässiga karakteristiska.

Ett liknande ordval har använts för att beskriva buskskiktet.

Trädgrovlek: Här har begrepp som slyskog-ungskog (= klen skog)-medelgrov-grov skog använts. Även beteckningarna grova eller mycket grova träd har använts.

Beteckningarna är en subjektiv uppskattning och termerna har anpassats till vad som är brukligt för respektive trädslag.

Ekar med 30-50 cm:s stamdiameter har klassats som grova medan alar med denna diameter har uppfattats som mycket grova.

Mycket grova ekar, askar och almar bör klart överstiga 1 m i stamdiameter.

Fältskiktstyp: Här har beteckningarna örttyp och ristyp använts. Ristyperna motsvarar ungefär hedseriens vegetationstyper och örttyperna ungefär ängsseriens vegetationstyper.

Fältskiktstyper som står och väger mellan ängs- och risserien har betecknats som ört/ristyp.

Fältskiktstyperna har sedan ytterligare delats in efter en fuktighetsgradient torr örttyp-frisk örttyp-fuktig örttyp (som inkluderar högörtstypen) och på motsvarande sätt inom risseriens vegetationstyper.

Under rubriken **Fauna och flora** har diverse uppgifter om objektens växt- och djurliv tillfogats. Vissa av uppgifterna har hämtats in vid fältarbetet och vissa har tagits ur litteraturen och/eller lämnats av olika personer.

Uppgifterna är ej insamlade på något enhetligt sätt men kan trots detta i många fall ge indikationer på ett bestånds naturvärde.

BEDÖMNING

Skogsbestånden har klassats i en tregradig skala där klass 1 utgör det högsta naturvärdet. Klass-1-objekten är enligt bedömning så värdefulla att de förtjänar skydd i form av reservatsbildning eller liknande.

Vid klassningen har jag ej använt något poängsystem utan den slutgiltiga bedömningen är en subjektiv sammanvägning av ett stort antal faktorer såsom:

- Storlek. Ett stort område är värdefullare än ett litet
- Skogens ”mognad” som ekosystem. Här har främst tittat på trädens ålder och grovlek liksom på förekomster av sena successionsstadier som torrakor, lågor, innanrötade träd och träd med bohål.
- Områdets variationsrikedom. Förekomst av diverse småbiotoper har höjt objektens naturvärde. Exempel på sådana biotoper kan vara block, lodytor, skogsbryn, bäckar, källor, källpåverkad mark, stränder och vattenfall.
- Frånvaro av diverse mänskliga ingrepp har varit positivt vid naturvärdesbedömningen. Exempel på sådana ingrepp är avverkningar, gallringar, röjningar, vägar, bebyggelse och luftledning.
- Representativa och unika skogstyper. Skogstyper som är sällsynta i landet eller i kommunen har fått höga naturvärden och detta gäller både för ”naturliga” skogstyper eller kulturprodukter. Representativa skogstyper har värderats högt eftersom de pekar på möjliga klimaxstadier denna del av Sverige. För Borås del har både hedekskogar, bokskogar och de, särskilt i den östra delen av kommunen, talrika sumpskogarna med dominans av björk och/eller al.
- En känslig fauna och flora som är knuten till lövskogar har värderats mycket högt. Särskilt vid bedömningen av hagmarker (både hävdade och igenväxta) har artrikedomen varit ett flitigt använt kriterium, varvid innanrötade träd, boträd, rik markflora och riklig epifytflora har värderats högt.

LÖVSKOGARNA I BORÅS KOMMUN - EN SAMMANFATTNING

Naturgeografiska förutsättningar

Borås kommun är en av de största i Älvsborgs län och ligger i det nordvästra hörnet av det sydsvenska höglandet.

De lägsta partierna (under 100 m) ligger i söder vid Seglora och Kinnarumma. De västra delarna av kommunen ligger mellan 100 och 200 m med stora höjdparter över 200 m-gränsen. I de östra delarna, runt Rångedala, Dalsjöfors, Målsryd och Dannike är vi som regel över 200 m med höjdryggar på över 300 m. De lägsta punkterna finns vid Viskans och dess biflöde Häggåns dalgångar vid kommungränsen, båda på ca 75 m ö h. Den högsta punkten ligger norr om Dannike och når 330 m ö h.

Då den s.k. högsta kustlinjen ligger runt 90 m i dessa trakter befinner sig kommunen så gott som helt över denna linje.

Berggrunden består nästan uteslutande av västsvenska gnejser. Små grönstensförekomster finns här och där.

Då gnejserna är en mycket gammal bergart har berget fått sina sprickor utvidgade och fördjupade under flera istidsperioder och formar idag ett så kallat sprickdalslandskap. Denna terrängtyp utmärker särskilt de västra delarna av kommunen.

De lösa jordarternas fördelning och kemiska sammansättning är i stort sett ett resultat av den senaste nedisningen. Inlandsisen har rört sig från nord-nordost mot syd-sydväst. I uppförsluten, från trakterna av Herrljunga och Falbygden, har isrörelsen minskat och avsättningen av material under isen har varit intensivare. I de östra delarna av kommunen har isen dessutom haft med sig mängder av finkornigt material från mer lättvittrade bergarter från Falbygden. Här har inlandsisen också byggt upp kraftiga moränryggar (drumliner) och lid-moräner etc. mot höjdparter i terrängen. Sydväst och väst om Borås minskar jordlagrens mäktighet hastigt när terrängen sluttar utför mot kusten.

I de östra delarna av kommunen är därför förutsättningarna för en lövskogsvegetation mycket större än i de västra. De talrika, fuktiga, lövskogarna med dominans av björk och al som man finner öster om Borås växer påfallande ofta i de nedre partierna av dessa drumliner och moränryggar. Inslaget av kalk är ibland stort och här finns t ex flera lokaler för gulsippa.

I de västra delarna är lövskogar sällsynta.

Denna geomorfologiska gräns delar också i stort sett av kommunen i två naturgeografiska regioner. Den västra (21b) kallas "södra Västergötlands sprickdalsområde" och den östra (11) kallas för "sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika västsida" (Nordiska Ministerrådet 1984).

Kommunen är relativt rik på framförallt små sjöar och flera av dem är typiska sprickdalssjöar som t ex Töllsjön, Viaredssjön, Öresjön och Frisjön.

Kommunen avvattnas både åt norr, väster och söder. Säven är en av källsjöarna till Sävån som rinner åt norr för att sedan svänga västern och rinna ut vid Göteborg. Östra och Västra Nedsjön avvattnas åt väster via Mölndalsån. Västra delen av kommunen avvattnas av Storån som rinner ut Kungsbackafjorden efter att ha passerat Lygnern.

De centrala och östra delarna avvattnas av Viskan med Häggån med mindre partier längst i östera vattnas av Ätran.

Klimatet är, framförallt de södra och sydöstra delarna, suboceaniskt d.v.s det kännetecknas av relativt milda vintrar och varma somrar. Nederbörds mängderna är stora, mellan 700 mm norr och 1000 mm i söder.

Borås har en årsmedelnederbörd på 898 mm, Bollebygd 937 och Dalsjöfors på 933 mm.

Räknar man årsmedelnederbörden för åren 1951-1980 erhåller man något högre värden där de sydvästra delarna runt Bollebygd har 1100 mm och de nederbördsfattigaste områdena runt Tämta ligger mellan 900 och 800 mm.

Lövskogarnas utbredning och fördelning

Ett mycket stort antal lövskogsobjekt har avgränsats i kommunen men de flesta är små och många ligger delvis i anslutning till varandra. Å andra sidan har ibland flera små lövskogsdungar slagits samman och fått bilda ett "objekt". Borås kommun har dock, med denna avgränsningsmetod, fått fler objekt än vad motsvarande lövskogsvegetation hade fått i t.ex. Alingsås och Lerums kommuner. En del smärre justeringar av gränserna och några nya objekt har tillkommit efter flygbildstolkningen i samband med min fältgenomgång. Dessa framgår av översiktskartan. Då mitt fältarbete främst inriktade sig på skogarnas fauna och flora har det biologiska innehållet blivit fylligare dokumenterat än i angränsande kommuner.

Lövinslaget är markant större i de östra delarna av kommunen. Även antalet lövskogstyper ökar mot öster och fuktiga björk- och alskogar ger stundom karaktär åt landskapet här. Dessa förhållanden kan i stora drag förklaras utifrån topografi, jordmån och markkemiska egenskaper.

Kortfattad beskrivning av de olika skogstyperna

Hedekskog

Ekskogarna är koncentrerade till de centrala och nordöstra delarna av kommunen. De är mestadels kläna till medelgrova med dominans av blåbär eller kruståtel i fältskiktet. Brakved och unga rönnar brukar vara de dominerande buskarna och mestadels står även bortdöende enar som ett minne från betestiden.

De största bestånden är Rya åsar och Hulta vid Borås, Rydekulla vid Brämhult, Hjorsered 5km norr därom, sluttningen väster om Rångedala och vid Kröklings hage.

Flera bestånd har en intressant epifytflora. I gynnade lägen brukar stammarna klädas av mossor som Antitrichia curtipendula och Frullania tamarisci. Gammelgranslaven Lecanactis abietina är ett suboceaniskt inslag på ekarna och flera andra lavar brukar uppträda ymnigt som

Usnea subfloridana, U. filipedula och i stark skugga den nordliga Lopadium disciforme. Av sällsyntare epifyter kan nämnas lunglav (många lokaler), skrovellav, blomskägglav och kortskattad parasitspik.

Ängsekskog

Ängsekskog är betydligt sällsyntare i kommunen och inga större sammanhängande bestånd finns av denna skogstyp.

I denna skogstyp dominerar hasseln i buskskiktet och fältskiktet är av torr eller frisk örttyp.

Särskilt rika bestånd med bl.a bingel, hässleklocka, vätteros och gulsippa finns vid Äspered (Sjöhagen invid Tolken) och Rångedala (Algutstorp).

Alm-askskog

Skogar med dominans av dessa trädslag är mycket sällsynta i kommunen. De är alla av det rika slaget med fältskikt av frisk till fuktig örttyp. Ett litet skogsparti vid Röl har dominans av alm. Här växer bl.a lavarna lunglav och Biatorella monasteriensis.

Askdominans finns i ett par degenererade askängen som t ex vid Häljared, Kulgrav och vid Aplakulla. Dessa bestånd hyser alla laven Gyalecta ulmi och de båda förstnämnda även Gyalecta flotoiwii.

Boskog

Boskogen är koncentrerad till de sydöstra delarna av kommunen. Ett par mindre bestånd finns även i nordost.

Stora värdefulla bokbestånd finns vid Målseryd, Hallared, Rölle, Dannike och Askanäs vid Tolken.

Alskog

Alskogar är relativt vanliga i kommunen och är koncentrerade till de centrala och östra delarna. Skogstypen förekommer i många olika varianter och helt stabil torde endast de skogar vara som är direkt påverkade av sjöar eller åar eller har ett mycket ytligt, rörligt grundvatten.

Dessa, mer eller mindre stabila alskogar är mycket sällsynta men ett par intressanta objekt av denna typ finns vid den lilla Marsjön på gränsen mellan Rångedala och Tärby socknar (bestånd 7227-16, 7228-2 och 7228-3). Dessa har stort inslag av gråal och en del våtmarksväxter som är knutna till näringsrika miljöer.

Andra mycket intressanta objekt i denna kategori är 7227-4 som har anslutning till en starkt förgrenad bäck och bestånd 7227-7 som uppträder i en nordsluttning med ytligt grundvatten.

De flesta alskogarna i Borås kommun har emellertid uppstått i sen tid på nedlagda betes- och slåttermarker. De är därför relativt och har ingen skoglig kontinuitet. Enstaka äldre hagmarks-träd, som t ex askar, kan finnas insprängda i bestånden.

På sikt torde dessa skogar övergå till sumpgranskogar på fattigare marker och eventuellt ask-sumpskogar på näringsrikare underlag. En del av dessa rikare skogar är klart skydds-värda redan idag och bra exempel är bestånd 7219-1, 7219-2, 7217-7b, 7208-15 och 7228-13 alla belägna invid eller strax söder om sjön Tolken.

Björkskog

Björkskogarna bar i stort sett samma utbredningsbild som alskogarna i kommunen. Unga björk- och alskogar ger idag en speciell prägel åt landskapet öster om Borås.

Inga skogar med höga naturvärden har hittats i kommunen.

Blandskog av trivaltyp (blandskog med ädellövinslag)

Detta är en vanlig skogstyp i kommunen och objekten sönderfaller i två klart skilda typer - dels unga första generationsskogar - och dels igenväxande hagmarker. I de fall där hagen har varit en ek- eller askhage kan denna skogstyp ha ett betydande inslag av ädla lövträd och har då stundom fått beteckningen "blandskog med ädellövinslag".

I denna kategori finns många bestånd med höga eller mycket höga naturvärden. Det är ofta de äldre hagmarksträden, med den fauna och flora som är knuten till dessa, som är anledningen till detta. För att på bästa sätt gynna detta växt- och djurliv bör man sträva efter att variera skötseln av dessa skogstyper. Många bestånd bör få växa igen och bilda naturskogsliknande bestånd medan andra bör öppnas upp igen och skötas som hagmarker.

Intressanta objekt i den första kategorin är 6286-13, 7208-13, 7218-2, 7227-4 och 7228-10.

Objekt där man kanske bäst gynnar de speciella naturkvaliteter som man finner där idag genom att öppna upp bestånden är t.ex; 6273-1, 6297-19, 7211-2, 7219-5, 7225-12, 7232-1 och 7236-1.

Björkhage

Björkhagen är som skogstyp vanlig i kommunen men trots detta är välhävdade björkhagar med äldre hagmarksträd sällsynta och inga skogligt intressanta objekt av denna skogstyp har hittats vid inventeringen. En välhävvdad björkhage som har fått högre värdering är den vid Öd (bestånd nr 6295-6).

Ekhage

Ekhagar är mycket vanliga i kommunen och är koncentrerade till de centrala och östra delarna. I de fall där eken är mycket gammal blir ofta de biologiska värden mycket höga vid en skoglig bedömning. Ekhagar av denna typ är mycket sällsynta men ett bra exempel är bestånd nr 6286-14.

Andra värdefulla ekhagar är t.ex; 6272-5, 6275-2, 7210-11, 7227-8 och 7228-12.

Hagmark med blandade lövträd

Även under denna rubrik har det samlats skogsbestånd av starkt växlande utseende och trädslagssammansättning. På torrare marker dominerar ofta de triviala lövträden tillsammans med gran och tall. Dessa har ofta låga naturvärden. Hagmarker på denna marktyp kan dock ibland ha ett stort inslag av ek och bär kan naturvärdena ibland bli höga.

På fuktigare marker kan inslaget av ask vara mycket stort och här ger kombinationen hög luftfuktighet och grova ädellövträd med relativt basisk bark upphov till en rik och skyddsvärd moss- och lavflora. Många objekt av denna typ är igenväxande askängen och några av dessa borde kunna restaureras. Det är i denna miljö som de båda "lövängslavarna" Gyalecta ulmi och Gyalecta flotowii har sina främsta förekomster. Bägge arterna är relativt vanliga i kommunen och av den förstnämnda finns det fler lokaler än vad t.ex. Storbritannien, Västtyskland och Benelux-länderna har tillsammans!

Värdefulla objekt av denna skogstyp är 6272-9, 6274-3, 6293-4, 6293-6, 6296-4 och 7208-14.

Värdefull flora och fauna knuten till lövskogen

Lövskogarna har en högre totalpopulation av fåglar än en barrskog. Man har beräknat att en gammal lövskog har mellan 800-1000 individer /2km medan en barrskog hyser mellan 200-400 individer /km². Även antalet arter är betydligt högre i lövskogen. Typiska lövskogsfåglar är skogsduva, mindre hackspett, nötväcka, entita, blåmes, stjärtmes, härmsångare, trädgårdssångare, liten flugsnappare, rosenfink, näktergal och stenknäck. I hagmarker med äldre lövträd brukar man dessutom finna gröngöling, kaja, kattuggla och stare.

De flesta lövträd lämnar värdefulla frukter och frön vilka utnyttjas både av däggdjur och fåglar. Större hasselbestånd är t.ex. viktiga för nötkräkan.

Fåglarna lämpar sig mindre väl att dokumentera i undersökningar av denna typ. Tidpunkt på året, väderleken och tillfälligheter spelar i alltför hög grad in på vilka arter som noteras vid besöken. De ovannämnda arterna har dock antecknats konsekvent då jag har träffat på dem i objekten. Stenknäck har observerats en gång (Henå vid Töllsjö) samt ytterligare en gång av A & E, liten flugsnappare vid två tillfällen (Häljared, norr om Dalsjöfors och vid Askanäs intill Tolken).

Det finns ett stort antal kärlväxter som är knutna till lövskogar. Flertalet av dessa förekommer ädellövskogar på mer eller mindre näringsrika och/eller kalkrika lokaler. Flera av dem är lutade boken Floravård i skogsbruket (Ingelög et al 1987). Björk- och alskogar innehåller relativt få lövskogsbundna arter. Korallroten (Corallorhiza trifida) växer ofta i björksumpskogar och alkärr hyser ofta känsliga ormbunkar.

De genuina lövskogsväxterna har antecknats konsekvent men även här spelar tidpunkten på året en stor roll för resultatet och listan är lång från fullständig. Denna flora är också relativt välkänd och inga nya lokaler för några känsliga arter har upptäckts vid denna inventering utom möjligen ett par noteringar av vätteros.

Även antalet kryptogamer som växer på marken eller på stenar och bergväggar är mycket stort och florans skiljer sig ofta från den i barrskogarna. Denna flora inventeras bäst på våren och hösten medan torra sommardagar lämpar sig mindre väl. De flesta arterna behöver studeras i mikroskop för att säkerställa arttillhörigheten men ett antal mer paranta arter har antecknats mer konsekvent.

Mossor och lavar som växer på träd (epifyter) är en grupp där många känsliga arter ingår och de flesta av dem är knutna till lövträd. Ett stort antal arter växer främst på mycket gamla träd och är av klimatiska skäl inskränkta till västra Sverige (s.k. suboceaniska arter). Tyvärr måste de flesta arterna studeras i mikroskop för att säkert kunna bestämmas varför endast ett begränsat antal har antecknats konsekvent. För dessa har jag upprättat en lokalförteckning i bilaga 1.

På epifytrika lokaler har jag även, på några platser, samlat in kollektioner av mer svårbestämda skorplavar vilka senare har bestämts av Leif Andersson, Väring.

Borås kommun har en mycket intressant epifytflora av framförallt de suboceaniska arterna. Lunglav har således 45 lokaler, örtlav har 1, skrovellav har 3, jättelav har 2 lokaler och korallblylav har 32 lokaler. Leptogium saturninum, har hittats fertil på en lokal och Lobaria pulmonaria på två. Ytterligare en lång rad hotade eller sällsynta arter finns i kommunen (se bilaga 1).

För några årtionden sedan var den s.k. suboceaniska lavfloran ännu rikare och Sandberg och Söderberg (1942) redovisar t.ex. Leptogium cyanescens, Sticta sylvatica och S. fuliginosa från Svaneholm och arter som Parmeliella plumbea, Pannaria conoplea och Pannaria rubiginosa hade då ett tiotal lokaler var i kommunen!

Äldre askar som bär spår av hamling är mycket vanliga i hela kommunen. Dessa har ofta en skyddsvärd epifytflora och almlaven finns t.ex. på 32 lokaler och dess mindre släkting Gyalecta flotowii på 7.

Evertebrater lämpar sig betydligt sämre att inventera vid denna typen av undersökningar. De flesta arterna fodrar speciella insamlingsmetoder och endast en mindre del av arterna kan bestämmas i fält.

Endast en art - den lövskogsbeboende violmyran (Lasius fuliginous) - har antecknats konsekvent.

Ibland kan djurens spår identifieras till art (gnagspår eller gallbildningar) och de kan då bli relativt lättinventerade.

Ett exempel på detta är gallmyggan Aganthomyia wankowiczi. Den orsakar karakteristiska gallar på undersidan av plattickan. Myggan tycks vara något mer värmekrävande än sin värdväxt och finns inte på tickans nordligare lokaler i Sverige.

LITTERATURLISTA

DEGELIUS, G. 1935: Das ozeanische Element der Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien. - Acta Phytogeogr. Suec. 7.

INGELÖG, T., THOR. & GUSTAFSSON, L. (red) 1987: Floravård i skogsbruket. Del 2. Artdel - andra upplagan. Jönköping.

LARSSON, K-H. 1987: Gingri - Mölarp, naturinventering. - Länsstyrelsen i Älvsborgs län, naturvårdsenheten rapport 1987:12.

LÖFGREN, O & MOBERG, R: 1984: Oceaniska lavar i Sverige och deras tillbakagång. Naturvårdsverket. Rapport. - SNV PM 1819.

NATURGEOGRAFISK REGIONINDELNING AV NORDEN. Nordiska Ministerrådet 1984.

NATUR I ÄLVSBOGERS LÄN. Inventering och handlingsprogram för allmän naturvård. - Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1976.

SANDBERG, C & SÖDERBERG, I. 1942: - Busk- och bladlavarnas utbredning i södra Västergötland, speciellt Boråstrakten. - Botaniska Notiser 1942: 178-190.

SÖDERBERG, I & SANDBERG, C. 1936: Bidrag till kännedomen om södra Västergötlands mossflora. - Svensk Bot. Tidskr. 30:193-213.

SÄLLSYNTA MOSSOR OCH LAVAR I BORÅS KOMMUN - LOKALFÖRTECKNING

MOSSOR

Dicranum fulvum

Gingri s:n
Kröklings hage, C. Sandberg 1931 (GB, S).

Douinia ovata

Borås s:n
Almenäs, C, Sandberg juli 1923 (LD).

Töllsjö s:n
Högåsen, H. Persson & C. Sandberg 22/10 1935 (LD).

Hylocomium brevirostre

Gingri s:n
Kröklings hage, C. Sandberg 1936 (GB).

Metzgeria conjugata

Borås s:n
Rya åsar, I. Söderberg 31/5 1923 (LD).

Seglora s:n
Viskafors, Svaneholm, C. Sandberg 21/7 1921 (LD, UPS).

Neckera pumila

Seglora s:n
Naturreservatet N Tranhult, på bok (I .Söderberg 1923) på sten 1987
(Tomas Hallingbäck, brev).

Pterogonium gracile

Seglora s:n
Naturreservatet N Tranhult, sparsamt (Tomas Hallingbäck, brev).

Trichocolea tomentella

Borås s:n
Rya åsar, sank mark. I. Söderberg 4/5 1919 (UME).

Tritomaria exsecta

Borås s:n
Rya åsar. I. Söderberg 1919 (UME).

Ulota coarctata

Borås s:n
Flera lokaler på 20- och 30-talet.

Seglora s:n
Två lokaler på 30-talet.

Kinnarumma s:n
Pärlebo, på asp i skogsbyn (Tomas Hallingbäck 1987).

LAVAR

Agonimia tristicula

Kinnarumma s:n
Kinnarumma kyrka, på en lönn.

Biatorrella monasteriensis

Bredared s:n
Röl, på grov alm.

Bryostigma leucodontis

Toarps s:n
Trängshult, på grov ask.

Kinnarumma s:n
Skällesnäs, på askar intill gården.

Calicium adpersum

Seglora s:n
Eskilsred, på en mycket grov ek intill gården.
Bua, på en mycket grov ek intill vägen.

Catinaria grossa

Borås s:n
L. Bosnäs, på hamlad ask tillsammans med lunglav och almlav.

Rångedala s:n
Algutstorp, på lönn intill bäcken.

Toarps s:n
Hjortryd, vid basen av asp tillsammans med *Parmeliella triptophylla*.

Collema furfuraceum

Toarps s:n
Bokhult, på ask.

Seglora s:n
Eskilsred, på lönn intill gården.

Kinnarumma s:n
Skällesnäs, på lönn i trädgården.

Collema nigrescens

Kinnekumla s:n
Skällesnäs, på ask (Tomas Hallingbäck i brev).

Collema subnigrescens

Rångedala s:n
Kinnekumla, på asp (Svante Hultengren muntl.).

Coniocybe pallida

Töllsjö s:n
Bosgården, på hamlad ask intill gården.
Henå, på grov ask intill bäcken.

Bredared s:n
Röl, på alm.

Gingri s:n
Kröklings hage, på grov ask.

Coniocybe sulphurea

Gustaf Adolf s:n
Älmås, på ask.

Toarps s:n
Häljared, på ask.

Gyalecta flotowii

Töllsjö s:n
Henå, på hamlade askar intill bäcken.

Gingri s:n
Kulgrav, på en hamlad ask intill gården.

Toarps s:n
Häljared, rikligt på hamlad ask och alm.

Ljusthult s:n
Prästgården, på en mycket grov hamlad ask.
Domänreservatet, på en mycket grov ek.
Påholmen, på en mycket grov hamlad ask.

Gustaf Adolf s:n
Älmås, på en hamlad ask.

Gyalecta ulmi

Töllsjö s:n
Kaggården rikligt på flera hamlade askar.
Henå, rikligt på flera hamlade askar.
Holmared, Svante Hultengren.

Bredared s:n
Aplakulla, på hamlad ask och alm, i en blockrik sluttning.
Fagerhult, på en grov hamlad ask i en blockrik sluttning.

Vänga s:n
Assmundared, på en hamlad ask intill gården.

Gingri s:n
Kulgrav, på ett par hamlade askar intill gården tillsammans med G. fltowii.

Rångedala s:n
Smedsgården, på en hamlad ask intill körvägen.

Äspered s:n
Väster om Sundholmen intill Tolken, vid avtagsvägen till barnkolonin rikligt på hamlad ask.
Dalshestre, rikligt på hamlade askar.

Toarps s:n
Häljared, rikligt på hamlad ask och alm.
Långhult, på ett par grova hamlade askar tillsammans med Peltigera collina.
Skattegården, på en hamlad ask i en beteshage.
Norr Draered, på en ask intill trädgårdarna.
Råslätt, hamlad ask intill gården.
Skår, hamlad ask intill gården.
Nygården, hamlad ask intill gården.

Trängshult, hamlad ask och alm intill gården
Bokhult, rikligt på hamlad ask och lönn.

Dannike s:n
Norr Åsengård, (Svante Hultengren).
S samhället, på hamlad ask i lundmiljö.

Gustaf Adolf s:n
Älmås, rikligt på hamlad ask.

Ljusthult s:n
Prästgård, på en grov hamlad ask.
Domänreservatet, på en mycket grov ek.
Påholmen, på en mycket grov hamlad ask.

Kinnarumma s:n
Sjöbo, på en ask intill samhället.

Borås s:n
L. Bosnäs, på hamlade askar intill gården.

Seglora s:n
Upptrost, på hamlade askar intill gården.
Ö. Hunghult, på hamlade askar intill gården.
Backa, på hamlade askar intill gården.
Eskilsred, på hamlade aska, intill gården.

Leptogium lichenoides

Seglora s:n
Eskilsred, på grov hamlad ask.

Toarps s:n
Skattegården, på grov hamlad ask.
Häljared, på grov ask.

Lobaria amplisslima

Ljusthult s:n
Lönnåsen, på lönn intill gården.
Ljusthult prästgård (Svante Hultengren).

Lobaria pulmonaria

Bollebygd s:n
Jordås, sparsamt på en hamlad ask och en asp intill en stenmur i en fuktig
al-björk-sumpskog.
Rörsjö, sparsamt på en hamlad ask intill gården.
Hultet, (Svante Hultengren).

Töllsjö s:n

Kaggården, på ca 10 hamlade askar norr om gården tillsammans med t.ex

Nephroma parile.

Bosgården, på en hamlad ask i trädgården, sparsamt.

Henå, på hamlade askar och lönnar intill ån tillsammans med *Gyalecta ulmi*, *G. flotowii*,
Frullania tamarisci och *Zygodon baumgartneri*.

Holmared, Lars Arvidsson (herb), Svante Hultengren.

Lindebräckan, på en lind intill trädgården.

Bredared s:n

Kulsjöholm, på ca 5 askar, rikligt. Tillsammans med *Parmeliella triptophylla*.

Bredared kyrkogård, sparsamt på en ask.

Röl, på ask, lönn och ek intill gården (ca 10 träd).

Risabo, på ask och alm intill bäcken nedanför gården (ca 5 träd).

Vänga s:n

Mellan Assmundared och Stensered, vid en ödegård. Rikligt på 6 aspar, sparsamt på två lönnar
tillsammans med *Pannaria mediterranea*, *Usnea filipendula* och *Peltigera collina*.

Tämta s:n

Ö. Boda, i domänreservatet på ca 20 ekar (i dålig kondition).

Giagri s:n

Hjortsered, på en ek intill häcken (sparsamt och i dålig kondition).

Äspered s:n

Björkeliden, sparsamt på 5 bokar.

Avtagsvägen till barnkolonin, rikligt på en hamlad ask - med apothecier. Tillsammans med
Gyalecta ulmi.

Sjöhagen, på en ask och ca lönn intill trädgården. Tillsammans med *Parmeliella triptophylla*.

Söder Tånggårde, sparsamt på en askbas.

Toarps s:n

Häljared, rikligt på askar (ca 30 träd) även på ek, alm och sälg. Tillsammans med *Gyalecta*
ulmi och *G. flotowii*.

Trängshult, sparsamt på ett par hamlade askar intill gården.

Rångedala s:n

Algutstorp, på grov hamlad ask.

Dannike s:n

Säggryd, på grov lönn.

Töllsjö s:n

Kaggården, på grov hamlad ask.

Ljusthult s:n

Halla, på en grov ask.

Leptogium saturninum

Bollebygds s:n
Rörsjö, på hamlad ask.

Dannike s:n
Rölle, på flera askar.

Rångedala s:n
Algutstorp, på grov hamlad ask

Gingri s:n
Kröklings hage, rikligt på grova askar.
Bondarp, på lönnar i en allé.

Gustaf Adolf s:n
Älmås, rikligt på en asp fertil.

Kinnarumma s:n
Kinnarumma, kyrka på lönn.

Leptogium teretiusculum

Vänga s:n
Assmundared, rikligt på skuggiga lönnstammar.

Rångedala s:n
Algutstorp, rikligt på grov hamlad ask.

Toarps s:n
Långhult, på grov hamlad ask.

Gustaf Adolf s:n
Hagadalen, sparsamt på en lönn intill gården.
Älmås, (enl Löfgren & Moberg 1984).

Kinnarumma s:n
Kinnarumma kyrka, på lönn.

Snaremossen, Svante Hultengren.
Tubbared, rikligt på lönn, asp och ek, med apothecier, tillsammans med *Parmeliella triptophylla*.
Bokhult, rikligt på ask, lönn och ek. Tillsammans med *Parmeliella triptophylla* och *Collema cfr furfuracea*.

Dannike s:n
Norr Åsengård, Svante Hultengren.

Gustaf Adolfs s:n
Hagadalen, sparsamt på en lönn intill gården.
Älmås, rikligt på ask och lind och på en lönn.

Ljusthult s:n
Lönnåsen, på en lönn. Tillsammans med *L. amplissima*.
Särila, sparsamt på ett par bokar (Thorbjörn Schafferer).
Fjästered, på ask och ek (ca 5 träd).
Hallered, på en bok.
Fjästered, vid avtagsvägen mot Ljusthult på lönnar.
Dräspbult, på alléträd invid vägen.
Örneberg, på alléträd invid vägen.
Berg i ostslutningen ned mot Lysjön sparsamt på ett par ekar och askar
i källpåverkad och skuggig skog.
Ljusthult prästgård, tillsammans med *L. amplissima* och på ca 10 ekar invid bilvägen mot
kyrkan och sparsamt på ask och alm.
Domänreservat, söder Backa, på ek och asp (ca 5 träd).
Väster Udden, på en rönn i en blockrik sluttning.

Kinnarumma s:n
Skällesnäs, på 4 askar tillsammans *L. scrobiculata*.

Borås s:n
L. Bosnäs, på en hamlad ask intill gården tillsammans med *Gyalecta ulmi* och *Catinaria
grossa*.
St. Bosnäs, ek ca 10 träd.

Seglora s:n
500 m N Yttre Näs, på en ek Tillsammans med *Parmeliella triptophylla*.
Yttre Näs. På hamlad ask och lind intill gården ca 10 träd.
Gatekullen, på två askar och en lind.
Älmhult, på ekar ca 20 träd.
Naturreservat N Tranhult, på en ek.
Eskilsred, rikligt på ekar ca 20 träd.

Lobaria scrobiculata

Rångedala s:n
500 m väster kyrkan, på två ekar i östslutningen.

Kinnarumma s:n
Skällesnäs, på askar.
Rogsås, på aspar.

Pachyphiale fagicola

Rångedala s:n
Algutstorp, på hamlad ask.

Pannaria conoplea

Gustaf Adolf s:n
Älmås, (enl Löfgren Moberg 1984).

Pannaria mediterranea

Vånga s:n
Norr Assmundared, på asp.

Kinnarumma s:n
Skällesnäs, den norra gården på lönn.

Parmelia tiliacea

Seglora s:n
Vid Yttre Näs, intill sjön Uppsalen på askar.

Gustaf Adolf s:n
Älmås, på grov ask.

Rångedala s:n
Rångedala kyrka, på ask.
Holmen, rikligt på askar intill vägen.

Parmeliella plumbea

Gustaf Adolf s:n
Älmås, (enl Löfgren & Moberg 1984).

Parmeliella plumbea

Töllsjö s:n
Kaggården, på ask

Kinnarumma s:n
Skällesnäs, på två askar vid ödegården tillsammans med *L. pulmonaria*.
Pärlebo, på sälk vid vägen 1987 (Tomas Hallingbäck i brev).

Lobaria virens

Gustaf Adolf s:n
Älmås, (enligt Löfgren & Moberg 1984).

Lopadium disciforme

Ljusthult s:n
Berg, på ek.

Rångedala s:n
Väster Rångedala kyrka, rikligt på ekar.

Gingri s:n
Hjortsered, rikligt på ekar.

Seglora s:n
Almhult, rikligt på ekar.

Nephroma laevigatum

Vänga s:n
Assmundared, på asp

Gustaf Adolf s:n
Älmås, (enl. Löfgren & Moberg 1984).

Nephroma parile

Töllsjö s:n
Högåsen, rikligt på asp och sälg.
Kaggården, på ask.

Vänga s:n
Assmundared, på aspar.

Bredared s:n
Kulsjöholm, på grov ask.

Toarps s:n
Bokhult.

Gingri s:n
Hjortsered, på ask.

Rångedala s:n
Väster Rångedala kyrka, på ek.
Algutstorp, på grov hamlad ask.

Toarps s:n
Trängshult, på grov hamlad ask.
Tubbared, på lönn.
Långhult, på en grov hamlad ask.

Seglora s:n
Yttre Näs, vid sjön Uppsalen på ask.

Kinnarumma, s:n
Skällesnäs, på askar.

Pertusaria flavida

Fristad s:n
Kulla, på ek.

Kinnarumma s:n
Skällesnäs, på ask (Tomas Hallingbäck i brev).

Seglora s:n
Eskilsred, på ek.
Bua, på ek.

Phaeophyscia endophoenica

Ljusthult s:n
Slättäng, på hamlad ask 1987 (Tomas Hallingbäck i brev).

Sphinctrina turbinata

Seglora s:n
Eskilsred, på ek med *P. pertusa*.

Toarps s:n
Trängshult, på ek med *P. pertusa*.

Usnea florida

Borgstena s:n
Klevaberget N Kleveryd. Sparsamt på ekar i östsluttningen.

Fristad s:n
Lida, på ask.

Bredared s:n
Kulsjöholm, på grova askar.

Gingri s:n
Hjortsered, vid basen av en hamlad ask.

Dannike s:n
Rölle, rikligt på askar.
Säggryd, på ask.

Rångedala s:n
Algutstorp, på lönn.
Falskogs källa, på askar intill en bäck.
Gravryd mellersta, vid basen av hamlad ask intill gården.
Söder Dalsjöfors, rikligt på aspar.

Äspered s:n
Sjöhagen, på ask intill gården.

Toarps s:n
Hjortryd, rikligt på aspar, fertil.
Tubbared, rikligt på asp och lönn fertil.
Häljared, på ask.
Trängshult, på grov hamlad ask.

Ljusthult s:n
N Hallared, vid avtagsvägen rikligt på en grov lönn.

Gustaf Adolf s:n
Älmås, (enl. Löfgren & Moberg 1984).

Seglora s:n
Vid Yttre Näs, intill sjön Uppsalen på en ek.

Peltigera collina

Bollebygds s:n
Rörsjö, på hamlad ask.

Töllsjö s:n
Lövebräckan, på en grov ask.
Henå, på hamlad ask.
Bosgården, på hamlad ask.
Kaggården, på hamlad ask.

Vänga s:n
Assmundared, på asp.

Ljusthult s:n
Halla, på askbas tillsammans med *Leptogium lichenoides*.

LÖVSKOGAR I BORÅS KOMMUN – OBJEKTBEKRIVNINGAR

Förklaring till tabellhuvud med skogliga uppgifter - se exemplet här bredvid.

Areal: Anges i ha.

Ädellövsog: Avser andelen ädellövsog i beståndet. Anges i procent.

Trädslagsfördelning: Antalet tiondelar av grundytan i ordning ek-bok-övrigt ädellöv-triviallöv.

Virkesförråd: Anges i kbm/ha.

Ålder: Anges i kategorierna; U = 0-40 år, M = 41-80 år, G = 81-.

Bonitet: Anges i kategorierna; S = svag, M = medelgod, G = god.

Virkeskvalitet: Anges i kategorierna; D = dålig, N = normal, MG = mycket god.

Åtgärdsförslag: Anges enligt följande; R = röjning, G = gallring, F = föryngringshuggning, - = ingen åtgärd. Åtgärdsförslagen är gjorda från rent skoglig synpunkt.

Areal (ha)	8,6
Ädellövsog (%)	70
Trädslagsfördelning	4-0-3-2
Virkesförråd	220
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G, F (om 10-20 år)

6272-1 Bönås

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En medelgrov ekskog med stort inslag av grov gran och litet inslag av björk. Beståndet är tämligen glest och sluttar ned mot St. Hålsjön.

Enstaka björklågor ingår.

Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Fauna och flora

Nötkråka observerades vid besöket (A & E).

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	12,3
Ädellövsog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-1
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6272-4 Eskilsred - Dyviken

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En gallrad mestadels klen alskog
Med stort inslag av gran.

Inslag av ek.

Buskskikt med brakved och viden.
Fältskikt av både friska och fuktiga ört- och ristyper.

Areal (ha)	6,6
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-5
Virkesförråd	190
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

I alskogen dominerar ställvis fuktälskande massor som *Thuidium tamariscinum* och intill bäckar påträffades *Bryum pseudotriquetrum*.

Bedömning

Klass 3.

6272-5 Eskilsred

Skogstyp

Ekhage, Ängsekskog, Hedekskog ÄL.

Ett variationsrikt och komplext område som till stora delar betas. I sluttningarna ned till Stora Hålsjön finner man en medelgrov ekskog med inslag av grova träd mellan åker- och ängsmarkmarken. Ett par mindre bäckar ingår i området.

Inslag av björk och al och litet inslag av gran,
lind och asp.

En mycket grov ek står intill gården vars krona till stora delar blåste ned under 69-stormen. Invid gården finns även en liten lövängsrest med grov hamlad ask och några lönnar.

Fältskikt av frisk ristyp med inslag av frisk örttyp i svackor och dråg.

Areal (ha)	10,6
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	6-0-2-2
Virkesförråd	130
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Vid besöket noterades gröngöling, blåsippa och skogsbingel. På de äldre träden finns en rik och skyddsvärd kryptogamflora. Lunglaven är frekvent och växer mestadels på ek och lind men även på några askar. På de äldre ekarna noterades även *Arthonia vinosa*, *Pertusaria flavida*, *Sphaerophorus globosus*, *Calicium adpersum* (en av två lokaler i Borås kommun), *C. viride*, *C. salicinum* och *Pertusaria pertusa* härbärgerar parasiten *Sphinctrina turbinata*, (en av två lokaler i Borås kommun) samt mossan *Antitrichia curtipendula*.

På de hamlade grova askarna påträffades lavarna *Gyalecta ulmi*, *Leptogium lichenoides*, *Collema cfr furfuraceum*, *Candelariella xanthostigma* och *Peltigera praetextata* och mossorna *Zygodon baumgartneri*, *Orthotrichum lyelli*, *Neckera complanata*, *Porella platyphylla*, *Homalothecium sericeum* och *Leucodon sciuroides*.

På gamla ekstubbar växer levermossan *Nowellia curvifolia*.

Bedömning

Ett vackert lövskogsbestånd intill St. Hålsjön som hyser betydande fauna och floravärden.
Klass 1.

6272-6 Rullebäck

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Grovstammig ek dominerar med stort inslag av björk och gran. Inslag av al och litet inslag av tall och lind. Enstaka torrakor och lågor ingår. En bäck rinner genom den östra delen.

Buskskiktet är glest med hassel och hägg.
Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,3
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-3
Virkesförråd	110
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6272-7 Bua - Jonsnäset

Skogstyp

Ekhage ÄL.

En öppen hästbetad ekhage som i bergbranten och de mer höglänta partierna blir skogbevuxen med klen till medelgrov ek.

Inslag av lind, tall och björk.

Hålträd förekommer sparsamt.
Fältskikt av frisk örttyp och ört-ristyp.

Fauna och flora

Lokal för vätteros, blåsippa och skogsbingel.

I håträden häckar bl.a stare.

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog	100
Trädslagsfördelning	8-0-2-0
Virkesförråd	170
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6272-8 Bua, östra

Skogstyp

Hedekskog, ekhage, ÄL.

Flera små ekdungar omgivna av åker- och skogsmark.

Fauna och flora

På en mycket grov ek intill växer Calicium adpersum (en av två lokaler i Borås kommun), Pertusaria flavida och Chaenotheca trichialis.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,2
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	130
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6272-9 Bua

Skogstyp

Hagmark med blandade lövträd ÄL.

Området utgörs av ett stenigt och skogklätt parti med en liten brant i en öppen hage.

Medelgrov ek och lind dominerar med inslag av alm och litet inslag av ask. Inslag finns även av asp och björk. Enstaka torrträd av ek och trivialöv.

Fältskiktet är av frisk och torr örtytp.

Fauna och flora

Gröngöling noterades vid besöket. Vätteros, blåsippa och skogsbingel påträffades sparsamt nedanför branten. På en ektorraka växte knappåslaven Calicium salicinum tillsammans med Ochrolechia turneri.

Bedömning

En skogsdunge som har stor betydelse både för landskapsbilden och fauna och flora.

Klass 2.

Areal (ha)	0,6
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	2-0-6-2
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6272-10 Lundsberg, nedergården

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En betad kulle där grov ek dominerar med inslag av medelgrov tall och björk. Beståndet är glest och något luckigt. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,6
Ädellövskog	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-1
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6272-11 Lundsberg

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Området har avverkats och kvar står nu några medelgrova ekar intill åkerkanten.

Intill bergsfoten längre mot öster står en smal bård av lind, ek och alm. Här finns många hålträd, torrakor och grova lövträdlågor.

Buskskiktet består här av hassel och skogstry. Fältskikt av frisk till torr örttyp.

Fauna och flora

Enligt NÄ förekommer blåsippa, trolldruva och trollsmultron.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	1-0-4-1
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6273-1 Transhult-reservatet

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

En rasbrant ned mot Ätran som till största delen är naturreservat. Området har tidigare haft lövängskaraktär och och hamlade lindar och almar står fortfarande kvar inne i skogen.

Eken samdominerar med triviallöv av asp och al. Inslag av lind, alm, gran och björk. Träden är klena till medelgrova.

Areal (ha)	1,3
Ädellövskog	100
Trädslagsfördelning	2-0-8-0
Virkesförråd	70
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt av hassel. Fältskikt av torr till frisk örttyp.

Fauna och flora

Spillkråkan konstaterades häcka i ett boträd i branten. Vid besöket noterades blåsippan och skogsbingel.

Lunglaven förekommer sparsamt på några ekar. På en hamlad alm noterades *Neckera complanata*. På bergväggarna förekommer sparsamt de båda sällsynta mossorna *Pterogonium gracile* och *Neckera pumila* på sina enda lokaler Borås kommun. Fynden gjordes av Tomas Hallingbäck den 7/3 1987.

Bedömning

Området har en rik flora och fauna och börjar få naturskogskaraktär. Klass 2.

6274-1 Rogsås, västra

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

En gles och något luckig medelgrov aspskog med inslag av björk och tall.

Buskskikt av enbuskar. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,7
Ädellövskog	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	110
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

6274-2 Rogsås, östra

Skogstyp

Ekhage.

Klen till medelgrov ek med litet inslag av björk och asp.

Buskskikt glest med en. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	40
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6274-3 Heden

Skogstyp

Ekhage, hagmark med blandade lövträd.
ÄL delar.

En östvänd sluttning med en del berg i dagen. Medelgrov ek dominerar norr. Mot söder ökar inslaget av framförallt asp (stort inslag) men det finns även litet inslag av björk och trädformig rönn.

Buskskikt av brakved, en och enstaka hassel.
Fältskikt av frisk örttyp och frisk ristyp.

Areal (ha)	0,6
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	90
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På bergsidorna finns mossjok av *Frullania tamarisci*, *Lejeunea cavifolia* och *Diplophyllum albicans*. Blandat med dessa mossor finner man också lavar som *Micarea lignaria* (mycket rikligt) och *Peltigera canina*, *P. praetextata* och *P. polydactyla*. På en asp påträffades *Nephroma parile*.

Bedömning

En vacker beteshage med vissa botaniska värden
Klass 2.

6275-1 Källenas

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En liten bäcksänka med medelgrov ek med litet inslag av björk och grov lind. Några ungplantor av skogslönn påträffades också.

I buskskiktet påträffas arter som hassel, brakved, rönn och hägg. Fältskikt av frisk ristyp, krustäteltyp och frisk örttyp.

Areal (ha)	6,9
Ädellövskog	80
Trädslagsfördelning	7-0-1-2
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass3.

6275-2 Skällesnäs

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag. Ekhage ÄL delar.

Norr om gården Skällesnäs ned mot Frisjön står glest ställda medelgrova ekar. Mot öster blir eken klenare och får stort inslag av björk och inslag av al och asp. Denna del av beståndet är nyligen gallrat. I väster finns

Areal (ha)	6,7
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-7
Virkesförråd	10
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

en liten fuktsänka som domineras av klibbal. Här finns det ett litet inslag av klen lönn.

Intill gården står ett tiotal planterade askar.

Buskskikt av brakved och viden. Fältskikt av frisk till fuktig ristyp.

Fauna och flora

På de grova askarna intill gården växer rikligt med *Lobaria scrobiculata* och *Lobaria pulmonaria*. Beståndet av skrovellav är det största i södra Sverige och torde uppgå till över 200 individer. På askarna finns även *Collema nigrescens*, *Pertusaria flavida*, *P. albescens*, *Parmelia acetabulum*, *Nephroma parile*, *Peltigera collina*, *Bacidia beckhausii*, *Bryostigma leucodontis* och mossarna *Zygodon baumgartneri*, *Frullania dilatata* och *Orthotrichum lyelli*.

Vid torpet öster om Skällesnäs finns *Lobaria pulmonaria*, *Bacidia rubella*, *Collema furfuraceum* och *Pannaria mediterranea* på en lönn.

Bedömning

Lövskogsbestånden intill sjön har ett stort landskapsvärde. Lokal för en känslig epifytflora. Klass 2.

6275-3 Skällesnäs, östra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag, björkskog.

Klen till medelgrov björk med inslag av grov ek, asp och gran.

En liten bäck och några bergväggar ingår i objektet. Beståndet är röjt. Enstaka lågor och torrakor finns.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-8
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	-
Virkeskvalitet	-
Åtgärdsförslag	-

6275-4 Skogaviken

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov ek och björk dominerar med inslag av gran, tall, asp och klibbal. Beståndet är delvis avverkad, gallrat och betat. Jordtäcket är tunt och berget går i dagen på flera platser.

Små fläckar med källpåverkad mark ingår.

Areal (ha)	4,3
Ädellövskog	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-4
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

6276-1a Mellansjöbo, västra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov ek med stort inslag av björk och inslag av gran, lind och lönn. Litet inslag av alm och ask. Området är starkt kuperat med branta bergväggar.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved.
Fältskikt av torr till frisk ristyp.

Fauna och flora

På en grov alm fanns laven *Catillaria globulosa*.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	6-0-1-2
Virkesförråd	110
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6276-1b Mellansjöbo, östra

Skogstyp

Ekhage ÄL.

En betad slänt med medelgrova ekar.

Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,7
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	25
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6276-2 Sjöbo

Skogstyp

Hedekskog. Ängsekskog. ÄL.

Medelgrov ek med inslag av gran och litet inslag av ask, lind, asp och björk. Området innesluter en del ängsmarker och betade skogspartier ingår delvis.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved

Areal (ha)	10,5 + 1,5
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-0-1-1
Virkesförråd	170
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

och nypon.
Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp och frisk örttyp.

Fauna och flora

På en ask påträffades *Gyalecta ulmi*.

Bedömning

Klass 3.

6276-3 Enekulla

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp, sumpalskog.

En bäckravin norr om Frisjön. Beståndet är klint.
En kraftledning skär genom området. Björk och klibbal dominerar med inslag av tall, gran och asp.
Närmast bäcken dominerar klibbalen helt.

Buskskikt av hägg och viden.
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,2
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	70
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6276-4 Halla - Arnäsholm

Skogstyp

Ängsekskog, blandskog med ädellövinslag, alskog, ekhage, (ÄL delar).

Det största partierna domineras av medelgrov ek med inslag av ask, lind, björk, asp och al. På fuktigare mark ökar inslagen av al och björk som kan dominera i små områden. Bestånden betas i vissa delar. Detta bestånd är uppsplittrat av fritidsbebyggelse och en del öppen ängs- och tomtmark ingår också. I den södra delen finns en badstrand.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved.
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

På äldre hamlade askar påträffades *Gyalecta ulmi*, *G. flotowii*, fertil, *Peltigera collina* och *Leptogium lichenoides*.

Areal (ha)	25,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G, F (om 1 år)

Bedömning

Klass 3.

6282-1 Grimmered

Skogstyp

Hedekskog, blandskog av triviallöv. ÄL delar.

Beståndet är gallrat och innesluter en del åker- och ängsmarker.

Buskskittet är glest med hassel och rönn.

Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp. (Oxalis-typen).

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,3
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	2-0-1-7
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6282-2 Skrimhult

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av gran och inslag av björk och asp. Beståndet är något luckigt och betas delvis. Enstaka lågor och ett par mindre bergväggar ingår.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,3
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-2
Virkesförråd	100
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

6283-1a Ingesjö

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Medelgrov till grov ek med litet inslag av björk.

Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,4
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6283-1b Inghult

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar även här i en gles hagmarksliknande skog men området betas ej mera. Många rösen med lind. Litet inslag av björk och asp.

Buskskikt glest med hassel och sälg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lokal för brudborste (A & E).

Bedömning

Klass 3.

6283-2 Koerhult

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Vid Koerhult finns små fläckar med hedekskog mellan åkermarken och den barrskogsdominerade skogen. Eken är medelgrov och har ett litet inslag av björk, asp och gran.

Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,3
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6283-3 Flyxhult

Skogstyp

Hedekskog, ängsekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerat med stort inslag av gran och inslag av björk och asp. I backen söder om husen står flera askar. Litet inslag av klen lönn. Enstaka lågor, bo-träd och inslag av klen bergväggar ingår. Beståndet är något luckigt och delvis betat.

Buskskikt av hasselhagtorn, druvfläder och hägg.

Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp.

Fauna och flora

Lokal för hasselmus (Thorbjörn Schafferer).

Areal (ha)	2,8
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-2
Virkesförråd	90
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 10år)

Bedömning

Klass 3.

6283-4 Backa

Skogstyp

Hedekskog, Alm-askskog. ÄL.

Öster om gården finner man igenväxta ekhagar med klenta till medelgrova träd med stort inslag av asp samt inslag av björk och gran. Strax söder om gården finns ett stenigt och fuktigt parti som domineras av ask, alm och lind. Intill gården finner man flera grova hamlade askar.

Fältskikt av frisk ört- och ristyp.

Areal (ha)	5,2
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	8-0-2-0
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

På de hamlade askarna intill gården växer *Gyalecta ulmi* och *Neckera complanata*.

Bedömning

Klass 3.

6283-5 Årbo

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En sydvänd, mycket storblockig, brant ned mot vägen intill Viskan. Medelgrov björk dominerar men inslaget av gran och ek är stort. Det finns även inslag av lind och asp och litet inslag av alm. Enstaka lågor av gran och asp ingår. Beståndet är gallrat och delvis avverkat.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	3-0-0-5
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk örttyp.

Fauna och flora

Lokal för skogsbingel (A & E).

Bedömning

Klass 3.

6284-1 Almhult

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En sydvänd brant med bergväggar och block. I trädskiktet dominerar medelgrov ek med stort inslag av gran. Inslag av björk. Litet inslag av asp.

Buskskikt av brakved och en. Fältskikt av frisk ristyp.

Fauna och flora

Lokal för blåsippan.

På ekarna växer rikligt med lunglav (*Lobaria pulmonaria*) och *Lopadium disciforme*.

Bedömning

Ett litet parti med ädellövskog i en trakt som totalt domineras av barrskogar.

Rik epifytlokal.

Klass 2.

Areal (ha)	0,4
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	9-0-1-0
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6284-2 Viskarhult

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En klen till medelgrov skog ned mot en liten sänka och en bäck. Björken dominerar med stort inslag av gran och ek. Inslag av asp och litet inslag av ask, lönn, al och tall. Enstaka yngre lågor och torrakor förekommer. Området utnyttjas som närströvsområde.

Buskskiktet är lätt med hassel och hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,1
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	2-0-1-5
Virkesförråd	100
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6284-3 Svaneholm

Skogstyp

Hedekskog, blandskog med ädellövinslag (ÄL delar).

En mycket storblockig västbrant intill samhället. Medelgrov ek dominerar men här finns även inslag av gran, lönn, lind, tall och alm. Delområde (b) domineras av triviallöv.

Buskskiktet är glest med hassel.

Areal (ha)	4,6
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	3-0-4-3
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fältskikt av torr och frisk örtyyp.

Fauna och flora

Lokal för skogsbingel, ormbär, blåsippa, vårärt och vippärt. Enligt Thorbjörn Schafferer finns även stjärtmes. Enligt LFF finns även kransrams och skogstry.

På blocken fanns *Neckera complanata* och *Scapania compacta*.

En äldre insamling av *Metzgeria conjugata* av Sandberg från 21/7 1921 finns i herbarierna vid Lund och Uppsala.

Bedömning

Rik flora. Ovanlig skogstyp.

Klass 2.

6284-4 Nya Sverige

Skogstyp

Hedekskog, ängsekskog ÄL.

En blockig brant ned mot vägen och Viskan. Beståndet är glest och luckigt, gallrat och delvis stört genom trädgårdsutkast.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av björk. Inslag av klen till medelgrov lind. Enstaka yngre lågor av björk förekommer.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	6-0-1-3
Virkesförråd	50
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F

Buskskikt är dåligt utvecklat på grund av att ungekar står relativt tätt i detta skikt. Enstaka rönnar förekommer också.

Fältskiktet är mycket varierande med frisk ristyp och kruståteltyp i mer höglänta partier och frisk till fuktig örtyyp i de lägre delarna.

Fauna och flora

Lokal för skogsbingel och blåsippa (A & E).

Enligt LFF finns även kransrams och skogstry.

Bedömning

Klass 3.

6286-1 Årebo

Skogstyp

Björkskog.

Areal (ha)	4,2
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

En sluttning ned mot en bäck med dominans av klen björk. Stort inslag av gran och inslag av al. Litet inslag av ask och lind. Området betas.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

6286-2 Gethult

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En liten kulle där medelgrov ek dominerar med mycket stort (30%) inslag av gran och stort inslag av björk. Inslag av asp och litet inslag av lönn och al.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-3
Virkesförråd	160
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6286-3 Äskhult

Skogstyp

Björkhage, ekhage.

Medelgrov björk dominerar. Ett litet parti domineras av ek. Inslag av ask och litet inslag av lönn, asp och al. Ett mindre vattendrag ingår i området.

Buskskiktet är glest med hassel och rönn.
Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,0
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	3-0-1-6
Virkesförråda	50
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6286-4 Håhult, norra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Brynvegetation mot granskog. Klen björk och al dominerar med inslag av asp och ek samt litet inslag av ask, fågelbär och lind.

Areal (ha)	2,3
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	1-0-1-7
Virkesförråd	80
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örtyyp.

Bedömning

Klass 3.

6286-5 Håbult, södra

Skogstyp

Ekhage. ÄL.

En ekhage som betas av häst. Medelgrov ek samdominerar med björk.

I buskskiktet ingår hasselbuskar. Fältskikt av frisk örtyyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,3
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	170
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6286-6 Drösshult

Skogstyp

Hedekskog. ÄL.

Klen till medelgrov ek med stort (40%) inslag av medelgrov till grov gran. Enstaka boträd förekommer och området betas.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp (dåligt utvecklat).

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-0
Virkesförråd	270-300
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På ekar och lönnar intill vägen växer lunglav (*Lobaria pulmonaria*).

Bedömning

Klass 3.

6286-7 Svalhult

Skogstyp

Ekhage, björkhage ÄL delar.

Beståndet är gallrat och delvis avverkat. Betas för närvarande. Eken och björken dominerar växelvis. Enstaka asklågor ingår.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örtyyp.

Areal (ha)	3,0
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	-
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

6286-8 Hökhult

Skogstyp

Björkskog.

Ung och klen björkskog.

I buskskiktet ingår glest med rönn och gran.

Fältskikt av fuktig örttyp

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	140
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

6286-9 Boden

Skogstyp

Björkhage.

En något lyckig björkhage med unga, klena träd. Litet inslag av klibbal och asp. Odlingsrösen ingår i beståndet.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	70
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6286-10 Sibbarp, norra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen till medelgrov björk och ek samdominerar med stort inslag av gran och litet inslag av klibbal. Beståndet är delvis avverkat och en kraftledning skär genom beståndet.

Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av frisk ristyp och frisk örttyp.

Areal (ha)	4,0
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-4
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

6286-11 Sibbarp, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En klen till medelgrov ekskog med stort inslag av medelgrov björk litet inslag av gran och al. Beståndet är delvis betat av får och en kraftledning skär genom beståndet.

Buskskikt av en och rönn.
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	90
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

6286-12a Krokstorp, norra

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Medelgrov ek med inslag av ask och björk. Litet inslag av klen och ung asp och rönn.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	6-0-1-3
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

6286-12b Krokstorp, södra

Skogstyp

Björkhage.

En tämligen tät björkhage med medelgrova träd och inslag av tall och litet inslag av ung gran.

Buskskikt av brakved, en och hägg. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	280
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

6286-13 Udden

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

En blockrik brant med stor trädslagsblandning. Medelgrov ek dominerar med stort inslag av lind och inslag av alm, lönn, asp, björk och gran. Almarna är grova och bär spår av hamling. Enstaka boträd, lågor och torrakor förekommer.

Buskskikt av hassel och rönn.

Fältskikt av friskört/ristyp.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	4-0-3-2
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Lokal för blåsippa.

På några rönnar växer *Lobaria pulmonaria*.

Bedömning

Ovanlig skogstyp. Rik flora. God epifytlokal.

Klass 2.

6286-14 Backa-reservatet

Skogstyp

Ekhage, hagmark med blandade lövträd.

ÄL.

Grov till mycket grov hagmarksek med stort inslag av gran och inslag av björk och ask. Enstaka mycket grova till medelgrova lågor och torrakor av ek förekommer.

Buskskikt av hassel med inslag av en och rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Areal (ha)	4,6
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-0
Virkesförråd	140
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Gröngöling häckar.

På ek och asp förekommer *Lobaria pulmonaria*. På de grova ekarna finns *Gyalecta ulmi*, *G. flotowii*, fertil, *Antitrichia curtispindula* och *Sphaerophorus globosus* högt upp på stammarna.

På nakenved av ek finns enrik Caliciacé-flora med bl.a den parasymbiontiska *Chaenothecopsis epithallina* på *Chaenotheca trichialis*.

Bedömning

Den förnämsta lokalen med gammelek i kommunen

Klass 1.

6286-15 Svenstorp

Skogstyp

Blandskog av triviallövv.

Medelgrov björk med inslag av medelgrov asp. Litet inslag av ung gran.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ristyp och krus-tåteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	125
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6286-17 Ljusthults prästgård, Backa

Skogstyp

Ängsekskog, hedekskog. ÄL.

Sluttningen mellan vägen och Ljusthults prästgård är bevuxen med en gles, medelgrov till grov ekskog. Litet inslag av alm, ask och lönn. En mycket grov hamlad ask står i sluttningen.

Buskskiktet är glest av hassel, nypon och rönn. Fältskikt av frisk ristyp.

Fauna och flora

Gröngöling vid besöket.

På ekarna finns rikligt med *Lobaria pulmonaria*. Lunglav finns sparsamt även på ask och alm. Den grova asken är hemvist för lavarna *Gyalecta umli* och *Gyalecta flotowii* och mossan *Frullania fragilifolia*.

Enligt Svante Hultengren förekommer *Lobaria amplissima* intill prästgården.

Bedömning

Gamla grova ädellövträd med en rik flora knuten till sig.
Klass 2.

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6286-18 Ljusthult

Skogstyp

Blandskog av triviallövv.

Medelgrov asp och björk samdominerar. Beståndet är delvis betat.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	-
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Buskskiktet är glest.
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

6287-1 Hallared

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Klen till medelgrov bok med sten inslag av medelgrov ek. Skogen är gallrad. Beståndet ansluter till mossan i väster och öster och genomkorsas av en väg. Enstaka lågor och torrakor samt boträd av t.ex. asp förekommer.

Buskskiktet är glest med rönn och brakved.
Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp och frisk örttyp.

Fauna och flora

Spillkråka vid besöket.

På en bok fanns lunglav (*Lobaria pulmonaria*).
Vid gården strax norr om området, intill väg 154, finns en planterad rad av grova lönnar med riklig påväxt av *Peltigera collina*, *Lobaria pulmonaria* och *Parmeliella triptophylla*. Intill lönnarna växer rikligt med tibast.

Bedömning

Ett stort bokbestånd. Ovanlig i skogstyp.
Klass 2.

6287-2 Särila

Skogstyp

Hedekskog, ängsekskog, ekhage. ÄL

Detta bestånd fungerar som närströvmråde för Aplaredborna och har flera gångstigar. Medelgrov till grov ek dominerar men beståndet är glest och luckigt. Beståndet är delvis betat. Inslag av bok, asp och björk. Litet inslag av ask, lind, lönn och gran.

Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av frisk ristyp och frisk örttyp.

Bestånd A	
Areal (ha)	A + B = 24,0
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	3-7-0-0
Virkesförråd	230
Ålder	M, G
Bonitet	M, G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bestånd B	
Areal (ha)	A + B = 24,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-2
Virkesförråd	230
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

Areal (ha)	5,2
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	8-0-1-1
Virkesförråd	90
Ålder	G
Bonitet	S, M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Enligt Thorbjörn Schafferer finns lunglav på ett par bokar.

Bedömning

Ett socialt värdefullt lövskogsbestånd med biologiska kvalitéer.
Klass 2.

6287-3 Kätteback

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med inslag av asp och björk.
Beståndet delvis betat. Intill bebyggelsen förekommer
Flera grova askar, almar och ekar. Området betas svagt.

Buskskikt av bl.a. hassel.
Fältskikt av frisk örtytp.

Areal (ha)	4,0
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-05
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Hasseln i området utnyttjas av nötkråka.

Enligt Thorbjörn Schafferer förekommer ormbär, brudborste och kärrfibbla.

Bedömning

Klass 3.

6287-4 Assared, norra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen till medelgrov ek dominerar, men inslaget av asp,
rönn och björk är stort. Inslag av ask och lönn. Klana lågor
förekommer. Området betas svagt.

Buskskiktet är dåligt utvecklat och i detta skikt förekommer
ställvis tätt med unglanor av ek, ask, asp och lönn.

Fältskikt av frisk ris- och örtytp.

Areal (ha)	11,2
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	3-0-1-7
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6287-5 Assared, södra

Skogstyp

Björkskog, alskog.

Klen till medelgrov björk- och alskog med inslag av gran, grov ek och grov ask. Marken är delvis källpåverkad. Beståndet är delvis betat.

Buskskiktet är glest med hassel och en. Fältskikt av frisk och fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,0
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-8
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	-
Åtgärdsförslag	G

6287-6 Gränd, nordöstra

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov al med stort inslag av gran. Området betas och är genomgallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

6287-7 Gränd, sydöstra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov ek i en sluttning med källpåverkad mark och ett litet bäckdråg. Stort inslag av gran och inslag av ask, asp, björk och al.

Buskskiktet är glest med sälg och brakved. Fältskikt av frisk och fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lokal för ormbär.

På ask och ek växer *Lobaria pulmonaria*. På ek påträffades rikligt med skorplaven *Lopadium disciformis* tillsammans med *Dimerella pineti*.

Areal (ha)	1,1
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	5-0-1-2
Virkesförråd	170
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 2 år)

Bedömning

En lokal med goda förutsättningar för en rik epifytflora.
Klass 2.

6287-8 Gränd, centrala

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En igenväxande beteshage som nu åter betas. Forn-
minnen ingår i beståndet. Klen till medelgrov ek
och björk dominerar med inslag av asp.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk örtytp.

Areal (ha)	5,5
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-6
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6287-9 Gränd, södra

Skogstyp

Blandskog av triviallövv.

Klen björk och al dominerar med inslag av asp och
litet inslag av ung ask och gran. Ett mindre vatten-
drag ingår i beståndet.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örtytp.

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	90
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6287-10 Gränd, nordvästra

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Slutningen väster om byn Gränd betas till stora delar.
Detta lilla parti av betesmarken domineras av klen till
medelgrov ek med inslag av al och björk. Litet inslag
av ask, gran och tall.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved.

Fältskikt av frisk örtytp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-0-1-2
Virkesförråd	80
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6287-11 Gränd, sydvästra

Skogstyp

Alskog.

Ett stråk med ytligt grundvatten i en sluttning som har vuxit igen med klen till medelgrov al. Inslag av ask och björk. Litet inslag av klen gran. På flera ställen går berggrunden i dagen.

Buskskiktet är dåligt utvecklat och domineras av viden med inslag av brakved och hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Areal (ha)	6,8
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-8
Virkesförråd	150
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6287-12 Stommen, västra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En sluttning med klen medelgrov ek med inslag av björk och asp. Intill åkrarna finns bl.a lind och ask.

Buskskiktet är glest med hassel och inslag av brakved, en och rönn. Fältskikt av frisk ristyp och frisk ört/ristyp.

Areal (ha)	3,0
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	150
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6287-13 Stommen

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov alskog med mycket stort (40%) inslag av gran och inslag av ek. Litet inslag av björk och asp.

Buskskikt av brakved och viden.

Fältskikt av frisk till fuktig ristyp.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-5
Virkesförråd	120
Ålder	M, G
Bonitet	M, G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

6287-14 Stommen, östra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

En grov ekskog med mycket stort (50%) inslag av gran. En mycket grov lind står i beståndet som också har litet inslag av ung lönn. Enstaka lågor förekommer.

Buskskikt glest av hassel. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövsskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-0
Virkesförråd	250
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 2 år)

6292-1 Hultet

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En liten kulle med flera hållar som domineras av medelgrov ek.

Buskskiktet är glest med rönn och en. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Fauna och flora

Lokal för lunglav (*Lobaria pulmonaria*) (Svante Hultengren).

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,3
Ädellövsskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	90
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6292-2 Upptröst

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ekskog som delvis betas och har karaktär av ekhage. Litet inslag av asp, lind, björk och gran.

Fältskikt av frisk ristyp.

Fauna och flora

Gröngöling sågs vid besöket. På ekarna växer *Arthonia vinosa*. Vid byn finns *Gyalecta ulmi* på

Areal (ha)	1,8
Ädellövsskog	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

hamlade askar.

Bedömning

Ett isolerat lövskogsområde i en barrskogsdominerad trakt av kommunen med stort värde för landskapsbildningen.

Klass 2.

6292-3 Ö. Hunghult

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Området utgörs av en igenväxt ekhage. Trädskiktet domineras av klen till medelgrov asp och björk med inslag av medelgrov ek och al. Litet inslag av grov lind. Rikligt med hålträd förekommer.

Buskskikt av brakved, viden och hägg.
Fältskikt av frisk till fuktig ört/ristyp.

Fauna och flora

Intill gården vid byn växer *Gyalecta ulmi* på hamlade askar.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,6
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-9
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6293-1 Råddeby

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Klen till medelgrov ek dominerar med stort inslag av klen asp och björk. Inslag av gran och litet inslag av al och tall. Beståndet betas delvis av får. Ett litet vattendrag ingår i beståndet. Enstaka yngre lågor och torrakor förekommer.

Buskskiktet är glest med en och någon hassel.
Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-4
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6293-2 Fjällstorp

Skogstyp

Björkskog

I slänten ned mot Aborrtjärn dominerar medelgrov björk med stort inslag av gran och asp. Lågor av björk och asp förekommer. Intill gården förekommer några grova lönnar. Området betas svagt av får.

Buskskiktet är glest med enstaka rönnar.
Fältskikt av fuktig örtytp.

Areal (ha)	0,6
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6293-3 Övre Näs

Skogstyp

Hedekskog.

Detta område ingår i ett välhävdad odlingslandskap med flera lövskogspartier, bryn, hasselridåer, småholmar och fina stenmurar. Många stora ekar och lindar finns i området. Beståndet är svagt betat. Medelgrov ek dominerar (60%) med stort inslag av björk och asp. Litet inslag av gran. Enstaka lågor av gran förekommer.

Buskskiktet är mycket glest med enstaka enar. Fältskikt av frisk ristyp.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	70
Ålder	M, G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

6293-4 Yttre Näs, centrala

Skogstyp

Hagmark med blandade lövträd.

Hagmark med grov asp och stort inslag av grov björk och grov ek. Inslag av medelgrov lind och klen till medelgrov gran. Enstaka torrakor och lågor av asp ingår. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är glest med en.
Fältskikt av frisk ristyp och frisk örtytp.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-7
Virkesförråd	70
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Beståndet ska ses i ett sammanhang med de intilliggande.
Klass 2.

6293-5 Yttre Näs, norra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag

Liten bäck ingår i beståndet. Beståndet är röjt och gallrat och betas delvis.

Buskskiktet är glest med en och hassel.
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	7,3
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-3
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På ett par ekar påträffades *Lobaria pulmonaria* och *Parmeliella triptophylla*. *Sphaerophorus globosus* förekommer på ekstammarna.

Bedömning

Ett stort lövrikt skogsområde med stora botaniska värden.
Klass 2.

6203-6 Yttre Näs, södra

Skogstyp

Hagmark med blandade lövträd. ÄL

Nedlagda åkermarker med talrika stenrösen och bryn som domineras av grova lindar vilka bär spår av hamling. Stort inslag av grov ek och inslag av björk och asp. Intill bebyggelsen finns grov hamlad ask. Området hamlad ask. Området betas av får.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved.
Fältskikt av örttyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	11,6
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	3-0-3-4
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På lind och ask förekommer lunglav (*Lobaria pulmonaria*). På ask finns också *Orthotrichum lyelli*, *O. Affine*, *Peltigera collina* och silverlav (*Parmelia tiliacea*) och på lind fanns *Catillaria griffithii*. På hamlad björk förekommer *Hypogymnia bitteriana*, *Mycoblastus sanguinarius* och *Bryum flaccidum*.

Bedömning

Rikligt med grov lind och ek i öppna och halvöppna lägen. Rik flora.
Klass 2.

6293-7 Björkhult

Skogstyp

Björkskog.

En ung klen sumpbjörkskog intill den lilla Björkessjön. Beståndet, som är röjt, är tätt och likformigt.

Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,9
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	100
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6293-8 Gatekullen

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

I sluttningarna runt byn vid Gatekullen växer grov gammal ask, alm och lind som delvis bär spår av hamling. Trädskiktet domineras idag av sekundärt uppkommen medelgrov björk och asp.

Buskskiktet är glest med hassel, brakved och sälg. Fältskikt av frisk örttyp.

Fauna och flora

På ask och lind finns lunglav (*Lobaria pulmonaria*).

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	ej spec.
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	Föryngr. m gran

6204-1 Funningen

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov alskog med inslag av ask, gran och björk. Litet inslag av ek.

Buskskiktet är glest med brakved. Fältskiktet är av högrörttyp med dominans av älggräs.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-8
Virkesförråd	170
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6294-2 L. Bosnäs, norra

Skogstyp

Björkskog.

En klen björksumpskog med stort inslag av asp och inslag av trädformig sälg. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskiktet är glest med brakved.
Fältskikt av fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,4
Ädellövs-kog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	70
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6294-3 L. Bosnäs, södra

Skogstyp

Blandskog med ädellövsinslag ÄL.

En igenvuxen lövängsrest med grov till mycket grov ask som bär spår av hamling. Stort inslag av björk och asp. Enstaka lågor och torrakor förekommer.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örtytp och högörtytp.

Fauna och flora

Lokal för brudborste.

På askarna fanns *Gyalecta ulmi*, *Catinarina grossa* och lunglav (*Lobaria pulmonaria*).

Bedömning

Gamla, grova ädellövträd med rik epifytflora.

Klass 2.

Areal (ha)	0,5
Ädellövs-kog (%)	50
Trädslagsfördelning	1-0-3-5
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6294-4 Bosnäs, västra

Skogstyp

Björkskog.

Klen till medelgrov björk med inslag av asp.

Buskskikt är glest med brakved. Fältskikt av fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,1
Ädellövs-kog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6294-5a Bosnäs, centrala

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Klen till medelgrov ekskog med stort inslag av klen björk och asp. Litet inslag av ung lönn.

Buskskiktet är tätt med brakved och rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Bestånd A +B	
Areal (ha)	3,6
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6294-5b Bosnäs, västra

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Klen till medelgrov ek med inslag av björk och asp.

Buskskikt är glest med brakved. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

6294-6 Äktasjön

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek med inslag av asp och björk. Ekarna är bredkroniga och har vuxit upp i hagmarks-miljö. Litet inslag av bok, lind och lönn. Enstaka grova eklågor förekommer.

Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp. Rikligt med liljekonvalj.

Areal (ha)	4,8
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Rikligt med lunglav (*Lobaria pulmonaria*) på ekarna. Lokal för *Arthonia vinosa*.

Bedömning

Ett äldre ekbestånd med tillgång på död ekved. Rik epifytflora.

Klass 2.

6295-1 Transås, norra

Skogstyp

Björkskog

Medelgrov björk med stort inslag av medelgrov al och inslag av asp. Litet inslag av unga lönnar.

Buskskikt är glest med rönn och videbuskar.
Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövsskog (%)	-
Trädslagsfördelning	-
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6295-2 Transås, västra

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

En liten bäckdal med dominans av klen till medelgrov rönn och björk. Inslag av asp, al och trädformig sälg.

I buskskiktet finner man mest viden.
Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6295-3 Flimmeshult, östra

Skogstyp

Björkhage.

Norr om gårdarna vid Flimmershult finns en liten men vacker björkhage med medelgrova till grova träd.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	60
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6295-4 Flimmeshult, västra

Skogstyp

Björkskog.

Medelgrov till grov björk dominerar med inslag av gran och asp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt är av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

6295-5 Östra Vik

Skogstyp

Björkskog

Medelgrov till grov björk.

Buskskikt glest av rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,1
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	170
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6295-6 Öd

Skogstyp

Björkhage.

Vid Öd finner man en mycket vacker och välhövad björkhage. Marken är relativt och en del berghällar går i dagen. Träden är medelgrova till grova. Litet inslag av ek och lind finns. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskikt av enbuskar. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

En välhövad björkhage av för kommunen relativt ovanlig typ.

Klass 2.

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6296-1 Transås

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Ett stort sammanhängande landskap med lövskogar och ängsmarker. Medelgrov till grov ek dominerar med björk och asp. Inslag av gran. Litet inslag av lind. Beståndet är genomgående gallrat och betas i vissa delar. Luftledningarna skär genom beståndet.

Areal	18,1
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-4
Virkesförråd	138
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Enstaka lågor och boträd förekommer.

Buskskiktet består av hassel, brakved, hägg och viden. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

6296-2 Ingelsbo

Skogstyp

Björkskog.

En ung, tämligen gles och något luckig sumpbjörkskog. Träden är klena. Skogsdikning har skett inom beståndet.

Buskskikt av viden.

Fältskikt av frisk örrtyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	10
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6296-3 Hagadalen

Skogstyp

Ekhage, Björkhage ÄL delar

På sluttningen norr om vägen dominerar medelgrov till grov ek och söder om vägen dominerar klen björk. Hagarna betas ej längre. I ekhagen finns ett glest buskskikt av hassel.

Fältskikt av frisk till fuktig örrtyp.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	80
Ålder	G
Bonitet	M, G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På en lönn intill gården växer lavarna *Lobaria pulmonaria* och *Leptogium teretiusculum*.

Bedömning

Klass 3.

6296-4 Almås

Skogstyp

Hagmark med blandade lövträd ÄL.

Ett rikt och varierat lövskogsområde runt byn Almås som ligger på en slänt ned mot vägen. Närmast vägen finns fuktiga partier med stort inslag av björk och al. I torrare avsnitt dominerar eken. Ett karakteristiskt

Areal (ha)	13,2
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	5-0-4-1
Virkesförråd	-
Ålder	M, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

inslag för dessa marker är de många grova, till mycket grova, hamlade lindar och askar som står kvar.

Medelgrov ek dominerar med stort inslag av björk, al och asp. Inslag av grov lind och litet inslag grov ask och alm.

Buskskiktet är glest med hassel, apel, brakved och en. Fältskikt av frisk till fuktig örtytp och av kruståteltyp.

Fauna och flora

I en ihålig ask konstaterades häckning av kattuggla. Gröngöling vid besöket.

Området har en mycket rik epifytflora. På äldre ask noterades *Parmelia tiliacea* (silverlav), *Chaenotheca carthusiae*, *Coniocybe sulphurea*, *Gyalecta ulmi* och *Gyalecta flotowii*. På ask, lönn och lind förekommer lunglav (*Lobaria pulmonaria*). På en asp fanns fertil *Leptogium saturninum*. Den epifytiska mossan *Frullania fragilifolia* är vanlig.

Persson & Sandberg insamlade mossan *Douinia ovata* här 22/10 1935.

Bedömning

Ett mycket vackert exempel på det äldre odlingslandskapet med många, grova och gamla, hamlade ädellövträd Rik och skyddsvärd kryptogamflora.

Klass 1.

6296-5 Änden

Skogstyp

Björkhage.

Grov och klen björk dominerar med stort inslag av grov ek och medelgrov asp. Beståndet är glest och något luckigt. Røjningar sker då och då.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	3-0-0-7
Virkesförråd	60
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

6296-6 Kakås

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Grov ek dominerar med inslag av grov gran, grov ask, medelgrov lönn, björk och al. Litet inslag av klen till medelgrov lind.

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	5-2-2-1
Virkesförråd	130
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Enstaka bergväggar, boträd och lågor förekommer.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Fauna och flora

Lokal för slåttergubbe (A & E).

Bedömning

En för kommunen relativt ovanlig skogstyp. Grova ädellövträd.

Klass 2.

6296-7 Stuvered, norra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov ek och björk dominerar med stort inslag av asp och gran.

Buskskiktet är mycket glest med hägg. Fältskikt av kruståtelty

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	3-0-0-5
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

6296-8 Stuvered, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En liten kulle där flera berghällar går i dagen. Medelgrov ek dominerar med inslag av gran, asp och björk. Låga bergväggar förekommer i beståndet.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk ristyp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-2
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6296-7 Lökared

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En slänt mot en väg.

Klen till medelgrov asp och björk dominerar.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	1-0-1-8
Virkesförråd	-
Ålder	-
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G, F (om 10 år)

Inslag av grov ask och ek. Inslag av klen till medelgrov gran förekommer också. Enstaka lågor av björk och asp förekommer.

Buskskikt av hassel, brakved, hägg, viden och rönn. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

6296-10 Björnåsen

Skogstyp

Björkskog.

Medelgrov till grov björk dominerar med stort inslag av asp och inslag av gran. Beståndet betas svagt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

6296-11 Ö. Sävshult

Skogstyp

Ädellövskog. Hagmark med blandade lövträd. ÄL.

Bestånden ingår i ett småskaligt och varierat odlingslandskap.

Medelgrov till grov björk dominerar men inslaget av medelgrov ek är mycket stort (40%). Inslag av klen till medelgrov, hamlad lind och litet inslag av klen lönn. Beståndet är gallrat.

Den norra delen betas och här finns framförallt klen ek och björk med inslag av några grova ekar och bokar. I denna del finns litet inslag av ask, och alm.

Buskskiktet är glest med rönn. I det norra partiet finns även hägg, olvon och hassel. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

6297-1 Råslätt

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Areal (ha)	2,3
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 2 år)

Areal (ha)	2,9
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	4-0-1-5
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Areal (ha)	51,0
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	2-7-0-1
Virkesförråd	200
Ålder	-
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Medelgrov bokskog med enstaka grova träd dominerar
Över stora områden i sluttningarna väster om Målseryd.
Inslaget av ek är ställvis stort. Litet inslag finns av alm,
ask, lind, asp, björk, al och tall. Området är blockrikt och
här och där finns branta bergväggar. Nedanför branten i de
östra delarna, blir marken fuktigare och inslaget av al och
björk ökar. Torrakor och lågor av bok ingår sällsynt.

Motionsspår och vandringsleder löper genom beståndet.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk ristyp och frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Vid anslutande gårdar finner man grova, hamlade askar med laven *Gyalecta ulmi* vid Nygården, Skår och vid Råslätt.

Bedömning

Ett stort och sammanhängande bokskogsområde med stora sociala och landskapliga värden.
Klass 2.

6297-2a Målseryd

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Flera små bestånd nära Målseryd samhälle. Grov till
medelgrov dominerar med inslag av grov ek.
Beståndet är gallrat.

Buskskikt mycket glest med rönn och hassel.
Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Bestånd A + B	
Areal (ha)	5,3
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	1-9-0-0
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	F

6297-2b Germundared

Skogstyp

Björkskog.

Klen till medelgrov björk dominerar med inslag av klen till medelgrov al och stort inslag av klen
gran. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

6297-3 Germundared, västra

Skogstyp

Granskog.

Medelgrov gran med stort (40%) inslag av grov ek.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,4
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-0
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6297-4 Germundared, södra

Skogstyp

Blandlövskog av trivialtyp.

Detta är ett luckigt bestånd som betas för närvarande. Medelgrov till grov gran dominerar med stort inslag av asp, björk och al. Inslag av bok. Ett mindre vattendrag finns i området.

Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av fuktig ört.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,8
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-4
Virkesförråd	130
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6297-5 Ekås

Skogstyp

Blandlövskog av trivialtyp.

Medelgrov al och björk dominerar. Inslag av bok.

Beståndet är delvis avverkat och gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-1-0-9
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6297-6 Målseryd, södra

Skogstyp

Boskog ÄL.

Medelgrov bok dominerar (50%) men inslaget av björk är mycket stort (40%). Inslag av ask. Beståndet ligger på en liten åsrygg och ett mindre vattendrag ingår.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	0-5-1-4
Virkesförråd	90
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt saknas.
Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

6297-7 Bråthult

Skogstyp

Boskog ÄL.

Sluttningar öster om Målseryds samhälle är bevuxna med klen till medelgrov bok med stort inslag av asp. Litet inslag av björk och al. Beståndet är gallrat. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	0-7-0-3
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6297-8 Slätthult

Skogstyp

Ekskog ÄL.

En sydvästsluttning bevuxen med grov till medelgrov ek med inslag av bok, björk och asp. Intill bäcken nere vid vägen tillkommer gråal.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg, rönn och olvon. Fältskikt av frisk till fuktig och våt örtytp.

Fauna och flora

På ekarna växer laven *Arthonia vinosa*.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	8,1
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-1-0-2
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

6297-9 Slätthult, norra

Skogstyp

Björkskog.

En fuktig dalsänka med dominans av medelgrov björk och stort inslag av al. Inslag av gran. Ett mindre vattendrag ingår i området.

Areal (ha)	3,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

6297-10 Tegalund

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov till grov bok dominerar med stort inslag av medelgrov ek. Beståndet är gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	3-7-0-0
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6297-11 Tegalund, västra

Skogstyp

Björkskog.

Ung och klen björkskog dominerar med stort inslag av ung och klen al.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6297-12 Lövåsen

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Grov gammal bokskog dominerar på denna delvis källpåverkad sluttningen. Inslag av ask och ek. I släntens nedre del finns inslag även av al och björk. Beståndet är delvis avverkat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	0-7-1-2
Virkesförråd	280
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6297-13 Halsaryd

Skogstyp

Björkskog.

Beståndet är glest och luckigt. Medelgrov björk dominerar med inslag av al och gran. Litet inslag av bok, lönn, asp och sälg. Marken är delvis källpåverkad. Beståndet är delvis avverkat, gallrat och en luftledning skär genom beståndet.

Buskskikt av sälg. Fältskikt av fuktig örtyyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	7,1
Ädellövsskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-8
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	R

6297-14 Sparenmossen

Skogstyp

Björkhage.

Klen till medelgrov björk med inslag av al. Fuktiga partier med, rörligt ytligt grundvatten, ingår.

Buskskikt saknas.

Fältskikt av frisk till fuktig och våt örtyyp.

Areal (ha)	4,5
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Enligt Svante Hultengren finns *Lobaria pulmonaria* vid gården.

Bedömning

Klass 3.

6297-15 Glafsered, västra

Skogstyp

Blandskog med ädellövsinslag.

Beståndet utgörs av en igenväxande hagmark där grov ek och ask sandominerar med klen till medelgrov al och björk. Inslag av klen gran. Ett mindre vattendrag finns i beståndet.

Buskskiktet är glest med brakved.

Areal (ha)	2,8
Ädellövsskog (%)	40
Trädslagfördelning	2-0-2-4
Virkesförråd	110
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fältskikt av frisk örtyyp.

Bedömning

Klass 3.

6297-16 Glafsered, östra

Skogstyp

Boskog ÄL.

En slänt som slutar vid en liten bäck med alskog. Gammal grov dominerar med stort (30%) inslag av grov gran. Litet inslag av björk och asp. Beståndet är gallrat. Enstaka torrakor och lågor ingår.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Fauna och flora

Enligt Thorbjörn Schafferer finns många starkt epifytbevuxna träd.

Bedömning

Klass 3.

6297-17 Trängshult

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

Runt gården Trängshult är marken stenig och sluttar ned mot den lilla sjön Lindåssjön. Här finns ekdominerade, numera övergivna beteshagar och en blandskog där grova grova hamlade askar och almar ingår som ett minne från en tid marken var en löväng.

Klen till medelgrov ek med inslag av björk, al och gran. Litet inslag av grov till mycket grov ask och alm. Torrakor, lågor och boträd ingår sparsamt. Beståndet är delvis gallrat. Källpåverkad mark ingår.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg och viden. Fältskikt av frisk till fuktig örtyyp och frisk ristyp.

Fauna och flora

På de grova, hamlade askarna och almarna finns lunglav (*Lobaria pulmonaria*), almlav (*Gyalecta ulmi*), *Bascidia fusca*, *Peltigera collina*, *Bryostigma leucodontis*, *Neckera complanata*, *Porella platyphylla* och *Zydodon baumgartneri*. På en ek fanns den parasitiska laven *Sphinctrina turbinata*.

Det finns bara på två ytterligare en (Eskilred) lokal i kommunen.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	0-6-0-1
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

Areal (ha)	3,8
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-2
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	R, G

Bedömning

Grova ädellövträd och en rik epifytflora.

Klass 2.

6297-18 Tubbared

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen till medelgrov björk och gran dominerar med stort inslag av medelgrov ek. Litet inslag av lönn, bok och al.

Buskskiktet är glest med brakved, en och trädformig rönn. Fältskikt av frisk ristyp och frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	2-2-0-3
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Lunglaven (*Lobaria pulmonaria*) är vanlig i området och växer på asp, ek och lönn. På det sistnämnda trädslaget är den fertil. *Parmeliella triptophylla* är också vanlig och anträffade på lönn och asp.

Bedömning

En rik epifytlokal som ansluter till en värdefull betesmark intill gården.

Klass 2.

6297-19 Bokhult

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag (ÄL delar).

Medelgrov till grov ek med stort inslag av hamlad, grov ask och inslag av lönn och asp. Väster om vägen betas området av häst. Källpåverkade miljöer ingår. Sparsamt med boträd, lågor och torrakor.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved och viden. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	5-0-2-3
Virkesförråd	60
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På ask och lönn växer *Gyalecta ulmi*. Rikligt med lunglav på lönn, ask och ek. En lång rad krävande epifyter påträffades såsom *Ulotia coarctata*, *Collema furfuraceum*, *Nephroma parile*, *Peltigera collina*, *Neckera complanata* och *Porella platyphylla*.

Bedömning

Ett vackert exempel på miljöer i det äldre odlingslandskapet. Mycket rik och välutvecklad, delvis hotad kryptogamflora.

Klass 1.

6297-20 Lönnåsen

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov bok dominerar med inslag av medelgrov asp och björk. Litet inslag av ek. Enstaka torrakor och högstubbar ingår. Beståndet är delvis avverkat och gallrat. Delar av objektet betas.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	9,2
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	0-8-0-2
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG, N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

På en grov lönn intill gårdarna växer jättelav (*Lobaria amplissima*) och lunglav (*Lobaria pulmonaria*).

Bedömning

Klass 3.

6297-21 Kärra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En slänt där medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov björk. Beståndet betas.

Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Areal (ha)	1,3
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	160
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6297-22 Fjästered

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ekskog med inslag av lind, ask, björk och gran. Området, som är kuperat, är ställvis rikt på block och källpåverkade partier ingår. Några av askarna intill gården bär spår av hamling.

Buskskiktet domineras av hassel med inslag av brakved. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp och frisk ört/ristyp.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-0-1-1
Virkesförråd	190
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	-
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Lokal för hässleklocka och hässlebrodd.
På ask och ek påträffades lunglav.

Bedömning

En liten brynskog med stora landskapsestitiska värden. Rik flora.
Klass 2.

6298-1a Sjögården, norra

Skogstyp

Ädellövsskog ÄL.

Medelgrov ek. ask och al dominerar i denna delvis käll-
påverkade sluttning. Inslag av alm, lind, asp och björk.
Litet inslag av ung lönn. Enstaka lågor, torrakor och
boträd av ex alm och lind förekommer.

Buskskiktet är tätt med brakved och hägg med
inslag av hassel, rönn och siden.
Fältskikt av fuktig örttyp.

Areal (ha)	2,8
Ädellövsskog (%)	50
Trädslagsfördelning	2-0-3-5
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	-
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6298-1b Sjögården, södra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL

Medelgrov ek dominerar med inslag av björk och
asp. Den övre delen är utröjd som beteshage. Be-
ståndet ansluter till en alsumpskog. Beståndet är
gallrat och grävda diken förekommer. Enstaka
lågor och torrakor förekommer.

Buskskiktet är tätt med hassel, hägg och brak-
ved. Fältskikt av fuktig örttyp.

Areal (ha)	5,0
Ädellövsskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-2
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G
(Bestånd C nedan har arealen 8,1 ha)	

Bedömning

Klass 3.

6298-1c Sundsryd

Skogstyp

Alskog.

Klen till medelgrov al dominerar med stort inslag av björk och asp. Litet inslag av ung ask.
Marken är delvis källpåverkad. Enstaka lågor och torrakor av asp och björk förekommer,

Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

6298-2 Mossängen - Mellsjön

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En tämligen svårframkomlig sydvänd brant ned till Mellsjön med dominans av grov bok och gran. Stort inslag av björk. Marken är blockrik med flera branta bergväggar. Många boträd, lågor och torrakor förekommer.

Areal (ha)	15,0
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	0-4-0-2
Virkesförråd	250
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Ett relativt orört bestånd med äldre ädellöv.

Klass 2.

6298-3 Dusekärr

Skogstyp

Björkskog.

En ständigt översilad fuktig slänt med dominans av klen björk och stort inslag av klen asp och al. Beståndet är röjt och grävda diken förekommer i kanten.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Areal (ha)	6,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

6298-4 Stuvhult

Skogstyp

Alskog.

Ett uppsplittrat bestånd med dominans av klen al och stort inslag av björk samt inslag av klen asp. Beståndet är röjt och gallrat.

Enstaka lågor av björk förekommer.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Areal (ha)	22,4
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	130
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G, F (om 10 år)

Bedömning

Klass 3.

6299-1a Storegården, södra

Skogstyp

Bokskog ÄL.

En söderslänt med dominans av medelgrov bok och stort inslag av grov björk. Beståndet är en gammal hagmark och bokarna har kraftiga grenar. Litet inslag av asp och ung gran. Beståndet, som är delvis avverkat är något luckigt.

Buskskiktet är glest med enstaka rönnar. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

6299-1b Storegården, norra

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Klen till medelgrov bok dominerar med inslag av grov gran och björk.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

6292-2 Lergered

Skogstyp

Björkskog

Medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen till medelgrov al. Inslag av asp. Litet inslag av klen gran. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskiktet är tätt med brakved och viden. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövsskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	190
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G, F (om 3 år)

Areal (ha)	2,3
Ädellövsskog (%)	80
Trädslagsfördelning	0-8-0-1
Virkesförråd	110
Ålder	U, M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Areal (ha)	3,1
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6299-3 Åsengård

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av medelgrov ask. Inslag av medelgrov gran, asp, al och björk. Litet inslag av bok. Beståndet är något luckigt och betas delvis. Rójningar och gallringar har skett i trädskiktet.

Buskskikt av hassel och brakved.
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	4-0-2-3
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Lokal för *Gyalecta ulmi* och *Lobaria pulmonaria* (Svante Hultgren).

Bedömning

Grov skog med ädellövträd. Känslig epifytflora.
Klass 2.

6299-4 Dannike, västra

Skogstyp

Bokskog ÄL

En slänt med alsumpskog i nederkanten. Medelgrov bok dominerar med stort inslag av medelgrov björk och al. Inslag av medelgrov gran. Litet inslag av klen lönn och ask. Beståndet är delvis avverkat. Enstaka lågor och torr-rakor förekommer.

Buskskiktet är glest med rönn.

Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. I nederkanten förekommer även fuktig örttyp.

Areal (ha)	10,7
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	0-5-0-4
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På ett par grova hamlade askar i kanten förekommer laven *Gyalecta ulmi*.

Bedömning

Klass 3.

6299-5 Dannike, östra

Skogstyp

Alskog.

Klen till medelgrov al dominerar med stort inslag av klen till medelgrov björk. Inslag av klen asp. Litet inslag av

Areal (ha)	10,1
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

klen ek och lönn. Beståndet är röjt och en kraftledning skär genom beståndet. Enstaka lågor förekommer. Buskskiktet är tätt med hassel, brakved, hägg och viden. Fältskikt av fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

6299-6 Dannike, södra

Skogstyp

Ekskog ÄL.

Klen till medelgrov ek dominerar med inslag av klen till medelgrov björk och asp. Litet inslag av grov bok. Beståndet är röjt och gallrat. Ett motionsspår finns i området.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

6299-7 Hult

Skogstyp

Boskog ÄL.

Medelgrov till grov bok med stort inslag av medelgrov björk och asp. Beståndet är röjt och gallrat och betas delvis.

Buskskiktet är glest med brakved och hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,8
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	0-6-0-4
Virkesförråd	300
Ålder	U, M, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	R, G, F (om 1 år)

6299-8 Hult - Backa

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Klen björk och al dominerar med stort inslag av klen asp. Beståndet är röjt och gallras.

Areal (ha)	26,1
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

Buskskikt av brakved och hägg. Fältskikt av fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

6299-9 Bäck

Skogstyp
Ekskog ÄL.

En lågvuxen och klen, något luckig ekskog som närmast har ekkrattkaraktär. Inslag av klen björk. Mycket hållmarker ingår i beståndet.

Buskskikt saknas. Fältskikt av torr till frisk ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövsskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6299-10 Rydet

Skogstyp
Björkskog.

Klen till medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen al. Litet inslag av klen gran och asp.

Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,5
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

6299-11 Bosgården, södra

Skogstyp
Alskog.

Medelgrov till grov, välgallrad alskog.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,6
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	-
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

6299-12 Bosgården, västra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov till grov björk dominerar med mycket stort (40%) inslag av medelgrov till grov ek. Litet inslag av asp och gran. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,4
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-5
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

6299-13 Bosgården, östra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Ett välgallrat och skött skogsbestånd. Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov bok. Litet inslag av klen alm

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	9-1-0-0
Virkesförråd	70
Ålder	M
Bonitet	M, G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

6299-14 Boanäs, norra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Detta är relativt exploaterat fritidsområde intill Yttre Åsunden. Trädskiktet omväxlar med låga bergryggar där berget går i dagen. Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov björk och tall. Litet inslag av asp. Låga bergväggar och en del lågor ingår.

Buskskiktet är glest med hassel, en och rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	20,8
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	6-0-0-3
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

6299-15 Boanäs, södra

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Även detta område är ett flitigt utnyttjat fritidsområde.

Areal (ha)	9,8
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	3-3-0-3
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Grov bok och ek dominerar med inslag av grov lind och medelgrov ask. Det finns även inslag av medelgrov asp, al, björk och gran. Några bokar är mycket grova. Området är blockrikt och mindre vattendrag ingår. Enstaka lågor förekommer. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är glest med en, hassel, brakved och hägg. Fältskikt av frisk örtytp.

Fauna och flora

Lokal för mindre hackspett (A & E).

Bedömning

Ett stort bestånd där grova ädellövträd ingår.
Klass 2.

7201-1 Grimsås, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med inslag av grov björk.
Beståndet är gallrat och betas delvis.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	170
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7201-2 Grimsås, norra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov asp och björk. Beståndet innehåller en del hållmarker. Skogen är gallrad och delvis betad.

Buskskikt av hassel och rönn.
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	S, M
Virkeskvalitet	N, (D bitvis)
Åtgärdsförslag	G

7201-3 Tubbegården

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Klen till grov ek i en källpåverkad slutning i Nolåns

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	140
Ålder	U, M, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G, F (om 2 år)

dalgång med stort inslag av björk och al. Litet inslag av asp. Intill gården är skogen avverkad.

Buskskikt av hassel med inslag av sälg.
Fältskikt av frisk till fuktig örtryp.

Fauna och flora

Epifyten *Ulota crispa* är vanlig. I de källpåverkade delarna växer mossor som *Thuidium tamariscinum*, *Brachythecium velutinum* och *Mnium punctatum*.

Bedömning

Klass 3.

7201-4 Holmen

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

En igenvuxen ekhage i sluttningen ned mot Nolån med grov ek och inslag av björk, asp och gran. Litet inslag av grov ask, al och lind. Fläckvis finns tätt med sly. Boträd och lågor förekommer.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved och hägg.
Fältskikt av frisk till fuktig örtryp.

Fauna och flora

Lokal för ormbär (A & E).

På ekarna växer *Arthonia vinosa* och vid en ekbas påträffades *Lecidea hypnorum*.

Bedömning

Klass 3.

7201-5 Hulta damm

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov al, asp och björk samdominerar. Inslag av medelgrov ek. Delvis källpåverkad mark. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av brakved och viden. Fältskikt av fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	5-0-1-2
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-9
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7201-6 Backa

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Brinkar och sandkullar intill Nolån bevuxna med en tämligen gles skog där ek, björk och asp samdominerar. Litet inslag av lind och trädformig sälg. Sparsamt med boträd, lågor och torrakor förekommer av björk och asp.

Buskskikt glest med enstaka videbuskar i fuktigare lägen. Fältskikt av friskt örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,2
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-5
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7201-7 Hulta

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Beståndet ansluter till en golfbana. Medelgrov asp, björk och al samdominerar. Inslag av ask, lind och alm. Litet inslag av klen gran. Beståndet är gallrat och röjt.

Buskskikt av brakved, hägg och rönn. Fältskikt av frisk och fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	0-0-3-7
Virkesförråd	120
Ålder	U, M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7202-1 Libberås

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

En relativt torr kulle där tall, asp och björk samdominerar. Beståndet är något luckigt. Røjningar har skett.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-7
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7202-2 Olofstorp

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Medelgrov gran, asp och björk samdominerar.
Runt en torpgrund finns även en del äppleträd.
Beståndet är röjt och gallrat. Enstaka lågor finns.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-7
Virkesförråd	70
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	M
Åtgärdsförslag	G

7202-3 Rödberg - Olsfors

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Ett något luckigt bestånd där gran, björk och al samdominerar. Inslag av asp. Beståndet är gallrat. Ett vattendrag med ett mindre vattenfall ingår. Skogsdikning har skett.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	12,5
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	-
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7202-4 Hultafors, västra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En kraftig sluttning där grov ek dominerar. Inslag av, delvis mycket grov ask, asp och björk. Litet inslag av lind och ung gran. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	8-0-1-1
Virkesförråd	170
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7203-1 Pukared

Skogstyp

Björkskog.

Klen björk dominerar med stort inslag av klen asp.

Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	40
Ålder	U
Bonitet	S
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7203-2 Mölnebacka, västra

Skogstyp

Ekskog ÄL.

Detta objekt består av två dungar med medelgrov till Grov ek. Stort inslag av gran och litet inslag av björk och asp. Enstaka lågor av ek förekommer. Till största delen betade områden.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp och av ört/ristyp.

Fauna och flora

Enligt A & E finns kattuggla.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,1
Ädellövsskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-1
Virkesförråd	210
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7203-3 Svarvhult

Skogstyp

Björkskog.

Klen till medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen till medelgrov al och inslag av klen gran. Beståndet är röjt. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	110
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7203-4 Svarvhult, östra

Skogstyp

Björkskog.

En relativt torr bergknalle. Klen till medelgrov björk dominerar med mycket stort (40%) inslag av klen asp. Beståndet är röjt.

Buskskikt av rönn och viden. Fältskikt av frisk Ristyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	50
Ålder	U, M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	R, F (om 2 år)

Bedömning

Klass 3.

7203-5 Fjällaberg

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En sydvänd brant ned mot Viaredssjön med ett gallrat bestånd av björk och asp med stort inslag av gran och tall. Litet inslag av ek och lind.

Buskskiktet är glest med hassel och inslag finns av brakved rönn och viden. Fältskikt av frisk örttyp och ört/ristyp.

Areal (ha)	2,0
Ädellövsskog (%)	20
Trädslagsfördelning	1-0-1-4
Virkesförråd	70
Ålder	M, G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Enligt A & E finns blåsippta och skogssallat.

Bedömning

Klass 3.

7203-6a Hultafors, östra

Skogstyp

Björkskog.

Medelgrov till klen björk med mycket stort inslag av klen till medelgrov asp. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	1,8
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	130
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7203-6b Hultafors, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med stort inslag av medelgrov asp och björk. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är glest med hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7203-7 Svarvhult, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov asp och björk. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	S
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

7203-8 Arås

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

En sluttning ned mot en sjö där medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov gran, asp och björk. Litet inslag av grov lind och klen ask. Granen har bitvis gallrats bort. Området betas delvis. Enstaka boträd förekommer.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-1
Virkesförråd	280
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G, F (om 10 år)

7204-1 Mölnebacka, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ck dominerar med stort inslag av grov gran
Inslag av grov tall och asp och björk. Beståndet är röjt
och gallrat. Ett litet vattendrag och mindre bergväggar
ingår.

Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av
frisk ristyp, krusräteltyp och frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,0
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-1
Virkesförråd	200
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG, N
Åtgärdsförslag	G

7204-2 Götebacka

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Tre dungar med medelgrov till grov ekskog som har
inslag av grov bok, gran, lind, asp och björk.

Buskskikt av glest ställda hasselbuskar. Fältskikt av
frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	6-1-1-1
Virkesförråd	190
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7204-3 Götebacka, östra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En slänt där medelgrov ek dominerar med stort inslag
av grov gran. Inslag av asp och björk. Beståndet är
röjt och gallrat. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk
ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-1
Virkesförråd	220
Ålder	M, G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7204-4 Källeberg

Skogstyp
Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov till grov björk. Beståndet är gallrat och betas svagt. En mindre vandringsled passerar genom beståndet.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

7204-5 Lindebergshult

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Området är stadsplanerat och kommer förmodligen att avverkas inom kort. Medelgrov till grov ask och ek dominerar med inslag av medelgrov till grov lind och asp, björk och al. De sistnämnda trädslagen dominerar längs en liten bäck som ingår i beståndet. Beståndet är röjt och gallrat och betas delvis.

Buskskiktet är tätt med hassel och brakved. Inslag av videbuskar. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,5 + 1,5
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	3-0-5-2
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	M, G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 2 år)

7204-6 Sjömarken

Skogstyp

Blandskog av triviallövv.

Medelgrov till grov asp och björk dominerar med inslag av grov gran. Beståndet som är röjt och gallrat gränsar till en badplats.

Buskskiktet är glest med videbuskar. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	160
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

7204-7 Sandared, södra

Skogstyp

Alskog.

Klen till medelgrov al med stort inslag (40%) av björk. En liten bäck rinner genom beståndet som gränsar till Viaredssjön. Området har ett visst rekreativvärde för befolkningen i Sandared.

Buskskikt av brakved, viden och hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	110
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7204-8 Lund

Skogstyp

Björkskog.

Detta bestånd ligger vid Viaredssjöns östra strand. Klen till medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen till medelgrov al. Beståndet är gallrat. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	100
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7204-9 Ek, västra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Ett sommarstugeområde invid Viaredssjöns södra strand. Klen till medelgrov björk dominerar med inslag av klen till medelgrov asp och al. Stort inslag av klen ek. Beståndet är gallrat och röjt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,2
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-8
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7204-10 Ek, östra

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

En splittrat bestånd som består av tre dungar. Medelgrov till ek och bok med inslag av grov lind, klen ask och medelgrov till grov björk, Litet inslag av poppel och blodbok.

Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,9
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	2-2-3-3
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

7204-12 Lundaskog

Skogstyp

Björkskog.

Klen till medelgrov med enstaka grova träd.
Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt av brakved och viden. Fältskikt av frisk till fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 2 år)

7205-1 Kvarnsjö

Skogstyp

Björkskog.

Medelgrov till grov björk dominerar med inslag av medelgrov till grov gran och tall. Beståndet är gallrat. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örtryp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

7205-2 Piclesjö

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag

Ett bestånd vid den norra kanten av den lilla sjön Piclesjön. En liten bäck ingår beståndet. Grov bok dominerar tillsammans med medelgrov björk. Stort inslag av medelgrov asp och inslag av medelgrov ek och al. Beståndet är gallrat. En kraftledning skär genom beståndet. Området är av ett visst intresse för friluftslivet och ett motionsspår går genom objektet

Areal (ha)	1,6
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	1-3-0-6
Virkesförråd	110
Ålder	U, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

7205-3 Rya åsar

Skogstyp

Hedekskog. Ängsekskog. Blandskog med ädellövinslag. ÄL

Rya åsar, med sina ekskogsbeklädda branter, är ett framträdande inslag i landskapsbilden och ett av de viktigaste rekreations- och närströvsområde för befolkningen i Borås. Motionsspår, slalomanläggning och utsiktspunkter finns i området.

Areal (ha)	104,4
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-0-1-2
Virkesförråd	200
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G, (F om 15-20 år)

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av alm, ask, bok, lind, lönn, asp, björk och gran. Nedanför Rya klint finns blockrika rasmarker, där lind och ek bildar det huvudsakliga trädsnittet. Bestånden är mestadels gallrade och välskötta men enstaka torrakor och lågor förekommer.

Vid Björbostugan och intill, den nedrivna, Ramshulan finns rester av askängar med hamlade träd. Ramshulans askänge är väl värd att restaureras.

Buskskikt. Hasseln är riklig och inslag finns av brakved, hägg och rönn. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp och av frisk ristyp.

Fauna och flora

Enligt NÄ förekommer hässleklocka, skogsbingel, kransrams, blåsippan, vårlök, svalört, myskmadra, springkorn, vårärt och hässlebrodd.

En del äldre fynd av sällsynta kryptogamer finns från Rya åsar. Söderberg har samlat *Metzgeria conjugata* den 31/5 1923 (herb Lund), *Trichocolea tomentella* den 4/5 1919 (herb Umeå) och *Tritomaria exsecta* 1919 (herb Uppsala). Enligt Söderberg & Sandberg finns också *Ulota coartata* (Söderberg & Sandberg 1936).

Bedömning

Ett stort sammanhängande lövskogsbestånd med mycket stora sociala, biologiska och landskapestetiska värden.

Klass 1.

7205-4 Norrmalm, norra

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

Medelgrov till grov asp och björk dominerar. Stort inslag av medelgrov tall. Litet inslag av klen ek och lönn. Beståndet är gallrat och motionsspår leder genom området. Enstaka lågor och boträd förekommer.

Buskskiktet är glest med hassel, brakved och rönn. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örtytp.

Areal (ha)	4,6
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

Bedömning

Klass 3.

7205-5 Kristineberg, norra

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Ett litet bestånd på en kulle inne i Borås stad. Grov bok dominerar med inslag av medelgrov till grov björk. Motionsspår leder genom beståndet.

Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk örtytp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	0-9-0-1
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

Bedömning

Klass 3.

7205-6 Kristineberg

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov asp och björk dominerar med litet inslag av alm, lönn och fågelbär. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örtytp och krusråteltyp.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-9
Virkesförråd	120
Ålder	U, M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

Bedömning

Klass 3.

7205 -7 Solhall

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Medelgrov asp och björk dominerar. Mycket stort inslag av medelgrov gran. Litet inslag av ek. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt av brakved. rönn och viden. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp

Areal (ha)	8,3
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-6
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7206-1 Norrmalm

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Medelgrov tall, asp och björk samdominerar. Beståndet är gallrat. Både block, bergväggar och lågor förekommer.

Buskskikt av brakved och rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Areal (ha)	14,3
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-6
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7206-2 Hulta

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Ett splittrat bestånd som omfattar skogspartier från Brämhult till Bergsäter.

Bergsslutningen och höjden vid Hulta kläds av en hedekskog. Beståndet domineras av klen till medelgrov ek med inslag av medelgrov till grov lind, asp och björk. I beståndet norr om denna kulle finns medelgrov till grov ask intill det lilla vattendrag som flyter fram här.

Areal (ha)	48,7
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-0-1-2
Virkesförråd	160
Ålder	M, G
Bonitet	S, M, G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G (F om 1 år)

Hela området är väl röjt och gallrat, varvid främst buskskiktet tagits bort, varigenom skogen fått

en parkliknande karaktär. Breda gruslagda gångar genomkorsar terrängen och en skidbacke har anlagts i mitten av sluttningen. Beståndet omges helt av bebyggelse och har främst ett intresse som närströvområde och som landskapselement.

Buskskiktet är mycket glest med brakved, viden, rönn, en och hassel. Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp och frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

7206-3 Östermalm

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov björk och asp. Bestånden är gallrade.

Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,7
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	160
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 2 år)

7206-4 Brämhult, södra

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

En randskog med medelgrov asp och björk. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av viden och rönn. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	R, F (om 1 år)

7206-5 Brämhult

Skogstyp

Björkskog.

Medelgrov dominerar med mycket stort (40%) inslag av medelgrov asp. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Areal (ha)	2,2
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	130
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7207-1 Frugården

Skogstyp

Björkskog.

Klen björk dominerar där enstaka grova björkar ingår.
Stort inslag av sälg. Inslag av asp.

Buskskikt av sälg. Fältskikt av högörttyp

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,6
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	50
Ålder	U
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7207-2 Lunden

Skogstyp

Blandskog av triviallövv.

Medelgrov asp dominerar i denna sedan länge övergivna björkhage. Inslag av grov rönn. Litet inslag av medelgrov björk och al. Beståndet är luckigt och gallrat. Delvis bete. Ett mindre vattendrag ingår liksom enstaka lågor av björk.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,7
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7207-3 Ryd

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

Medelgrov till grov ekskog med stort inslag av klen ask. Litet inslag av alm, lind, lönn, asp, björk och al.

Buskskikt av hassel med inslag av sälg och rönn.
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	3-0-4-3
Virkesförråd	120
Ålder	M, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

7207-4 Vårslebacken, västra

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

Medelgrov björk och gran dominerar. Stort inslag av medelgrov al och litet inslag av medelgrov asp. Beståndet, som betas, är gallrat och en kraftledning skär genom objektet.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk ristyp och fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-6
Virkesförråd	200
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7207-5 Vårslebacken, östra

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Grov ek och bok dominerar med inslag av medelgrov björk och al. Beståndet är gallrat och betas delvis.

Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	4-3-0-3
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7207-6 Långhult, västra

Skogstyp

Alskog, björkskog.

Medelgrov al och björk växlar i dominans. Stort inslag av gran och inslag av asp. Ett litet vattendrag rinner genom beståndet. Lågor och torrakor av de triviala lövträden är frekventa.

Buskskikt av viden. Fältskikt av högörttyp.

Bedömning

Beståndet har stor betydelse för fauna och flora.

Klass 3.

Areal (ha)	5,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-7
Virkesförråd	170
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7207-7 Långhult, östra

Skogstyp

Boskog, ekskog. ÄL.

Grov till mycket grov bok och ek i en blockrik sluttning. Inslag av grov gran, asp, björk och al. Små vattendrag och källpåverkad mark ingår i området. Beståndet är förhållandevis orört och hyser rikligt med lågor, torrakor och boträd.

Närmast gården står flera mycket grova hamlade askar. Flera av dessa är kraftigt innanrötade och döende.

Areal (ha)	10,2
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	3-3-1-2
Virkesförråd	300 (bitvis 350)
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt av hassel och rönn. Fältskiktet är mycket varierande från friskt till fuktigt i både ängs- och risserien.

Fauna och flora

Vid källdragen växer häxört.

På bokarna påträffades laven *Fuscidea cyathoides* var *corticola*. På askarna finns rikligt med *Gyalecta ulmi* och *Peltigera collina* samt *Leptogium teretiusculum*.

Bedömning

Ett varierat och rikt område med stora biologiska värden.

Klass 2.

7207-8 Stenvik

Skogstyp Hedekskog ÄL

Klen till grov ek dominerar med stort (40%) inslag av medelgrov asp. Litet inslag av medelgrov björk. Beståndet är gallrat. Enstaka lågor ingår.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,7
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	200
Ålder	U, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7207-9 Senåsa

Skogstyp Hagmark med blandade lövträd.

Medelgrov till grov ek med stort inslag av asp, björk och trädformig rönn. Litet inslag av al. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är tätt med hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,4
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	3-0-0-7
Virkesförråd	130
Ålder	U, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7207-10 Senåsa, Kråkhult

Skogstyp Björkskog, alskog.

Marken är blockfri och jämn då bestånden troligen vuxit upp på slättermark. Klen till medelgrov björk och al dominerar växelvis. Stort inslag av asp. Litet inslag av ek. Bestånden är mestadels gallrade och betade. Enstaka boträd, lågor och torrakor förekommer.

Buskskikt av viden. Fältskikt av högörttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	45,1
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7207-11a Torpen

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Ett splittrat bestånd som består av ett par igenvuxna ek-hagar. Medelgrov ek och grov bok dominerar. Inslag av medelgrov asp och björk. Beståndet är gallrat och betas.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	4-3-0-3
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7207-12 Senåsa, södra

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Medelgrov asp och björk. Beståndet är betat och gallrat. Grävda diken förekommer.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,4
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7207-12 Skäftingsbacka

Skogstyp

Blandskog av triviallövv. Hagmark med blandade lövträd.

Klen till medelgrov björk och al samdominerar. Beståndet är gallrat. Objektet betas öster om vägen.

Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av kruståteltyp och fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,1
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	180
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7207-13 Furuhaga

Skogstyp

Hagmark med blandade lövträd ÄL.

En tämligen torr kulle. Grov bok dominerar med mycket stort inslag av medelgrov till grov ek. Inslag av medelgrov asp och björk.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	3-5-0-2
Virkesförråd	150
Ålder	-
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

7207-14 Bygd

Skogstyp

Bokskog ÄL.

En medelgrov tät bokskog.

Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,4
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	0-10-0-0
Virkesförråd	200
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7207-15 Kulla

Skogstyp

Bokskog ÄL.

En likformig och tät bokskog med medelgrova till grova dimensioner. Inslag av grov ek. Enstaka lågor av bok förekommer.

Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,8
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	1-9-0-0
Virkesförråd	280
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7207-16 Bränneback, västra

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov bok med inslag av ek. Beståndet är gallrat och betas av häst.

Buskskikt glest av rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	1-9-0-0
Virkesförråd	190
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7207-17 Bränneback, östra

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov till klen bok i en sydvänd brant. Marken är blockig med en del branta bergväggar. Beståndet är gallrat och all gran har nyligen tagits bort. Enstaka klena lågor ingår.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örtyyp. Dåligt utvecklade.

Areal (ha)	4,0
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	230
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F

Bedömning

Klass 3.

7207-18 Uppegården

Skogstyp

Ekskog ÄL

Medelgrov ek med stort inslag av björk. Beståndet är kraftigt gallrat.

Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk till fuktig örtyyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	70
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7207-19 Uppegården, norra

Skogstyp

Ekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek med stort inslag av gran. Inslag av asp och björk. Litet inslag av ask. Den norra delen av beståndet står på en rullstensås som utgör den sydligaste delen av Rångedalaåsen.

Buskskikt av hassel med inslag av en, brakved och viden. Fältskikt av frisk ört/ris-typ med mycket liljekonvalj och högörtyyp.

Fauna och flora

Enligt A & E finns skogsbingel.

På ekarna finns rikligt med *Arthonia vinosa*. På asparna finns rikligt med fertil *Parmeliella*

Areal (ha)	8,4
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-0-0-1
Virkesförråd	160
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

triptophylla tillsammans med *Catnaria grossa*.

Bedömning

Ett vackert lövskogsbestånd med en rik epifytflora i anslutning till samhället Dalsjöfors.
Klass 2.

7207-20 Hjortryd, södra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

I denna sydvästvända brant växeldominerar ung och klen bok med klen ek. Inslag av gran och björk.

Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av frisk örttyp.

Areal (ha)	7,1
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	4-4-0-1
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7207-21 Hjortryd, norra

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

En slänt med en liten bäck i anslutning till en hembygdsgård. Medelgrov till grov ek och bok dominerar med stort inslag av medelgrov gran. Litet inslag av ask, lönn, asp och björk. Beståndet är gallrat och grävda diken förekommer. Enstaka boträd och lågor förekommer.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	2,8
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	3-3-1-1
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

Enligt A & E förekommer lundkovall (*Melampyrum nemorosum*).

Bedömning

Klass 3.

7207-22 Dalsjöfors, västra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Ett luckigt bestånd där medelgrov till grov ek dominerar. Stort inslag av medelgrov björk.

Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7207-23 Toarp

Skogstyp

Björkskog.

Tre bestånd på torvmarker sydöst om Toarps samhälle. Klen till medelgrov björk dominerar med inslag av medelgrov gran och tall. Bestånden är luckiga och genomgallrade.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Areal (ha)	15,2
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7208- 1 Stålarp, norra

Skogstyp

Blandskog av triviallöf.

Klen till medelgrov asp och björk. Beståndet betas. Enstaka lågor förekommer.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Areal (ha)	0,7
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7208-2 Stålarp, södra

Skogstyp

Ekskog ÅL.

Medelgrov till grov ek med stort inslag av grov bok. Inslag av gran och litet inslag av björk och al. Beståndet är gallrat.

Enstaka torrakor av ek förekommer, dessa har ringbarkats av grisar!

Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av frisk örttyp. Dåligt utvecklat.

Areal (ha)	2,5
Ädellövsskog (%)	80
Trädslagsfördelning	5-3-0-1
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

Bedömning

Klass 3.

7208-3 Skänstad, nordöstra

Skogstyp

Björkskog, alskog.

Klen till medelgrov björk och al med stort inslag av medelgrov gran. Litet inslag av ek, ask och asp. Beståndet är en igenvuxen hage.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	11,1
Ädellövsskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-7
Virkesförråd	110
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7208-4 Assargården, norra

Skogstyp

Askskog ÄL.

Klen askskog med enstaka medelgrova träd och stort inslag av björk och al. Litet inslag av asp, ek och lind.

Buskskikt mycket glest med hägg. Fältskikt av högörttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,1
Ädellövsskog (%)	60
Trädslagsfördelning	0-0-6-4
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7208-5 Assargården, södra

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov alskog med stort inslag av björk. Buskskikt glest av viden. Fältskikt av högörttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,5
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7208-6 Skänstad, västra

Skogstyp

Bokskog ÄL.

I detta bestånd bar granarna nyligen gallrats bort. Medelgrov till grov bok dominerar med mycket

Areal (ha)	12,6
Ädellövsskog (%)	80
Trädslagsfördelning	3-5-0-2
Virkesförråd	260
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

stort inslag av medelgrov till grov ek och inslag av medelgrov björk. Betas delvis. Enstaka lågor förekommer.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp.

Bedömning

Klass 3.

7208-7 Skänstad, sydöstra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen till medelgrov björk och al dominerar men inslaget av ek är stort. Beståndet är betat och delvis avverkat.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av fuktig örttyp

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	8,2
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-8
Virkesförråd	20
Ålder	U, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	R

7208-8 Kronolund, västra

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov till grov bok med stort inslag av medelgrov ek. Litet inslag av asp, björk, gran och lönn. Bestånden är gallrade.

Buskskiktet är glest med rönn och hassel. Fältskiktet är glest av frisk örttyp.

Bedömning

De lövklädda kullarna och sluttningarna har stora landskapsmässiga värden.

Klass 2.

Areal (ha)	15,9
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	2-6-0-2
Virkesförråd	260
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F

7208-9 Skattegården, västra

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Klen till medelgrov al och björk samdominerar. Stort inslag av asp.

Buskskiktet är glest med brakved och viden. Fältskikt av högrörtyp.

Areal (ha)	18,3
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	160
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7208-10 Kronolund

Skogstyp

Hage med blandade lövträd.

Grov ek och björk dominerar med inslag av ask, lind och fågelbär. Litet inslag av klen lönn. Beståndet är röjt och delvis avverkat.

Buskskiktet är glest med hassel och brakved. Fältskikt av kruståteltyp.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	3-0-2-5
Virkesförråd	90
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	R

Bedömning

Klass 3.

7208-11 Skattegården, östra

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Grov till mycket grov ek dominerar med inslag av medelgrov asp, björk och al. Beståndet är gallrat och en kraftledning skär genom området.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På en grov hamlad ask fanns lavarna *Leptogium lichenoides* och *Bacidia fusca*. Enligt A & E förekommer skogsbingel.

Bedömning

Ekhage med vissa floristiska värden.

Klass 2.

7208-12 Ammarp

Skogstyp

Askskog ÄL.

Medelgrov till grov ask med stort inslag av asp. Inslag av ek och al. Litet inslag av björk. Bestånden är gallrade och betas delvis. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg och olvon. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	4,6
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	1-0-6-3
Virkesförråd	300
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

Bedömning

Klass 3.

7208-13 Rölle

Skogstyp

Bokskog, blandskog med ädellövinslag, blandskog av trivialtyp. (ÄL delar).

Medelgrov bokskog med inslag av gran, ek, asp, björk och ask. Bestånden är gallrade och delvis betade. Ett par små bäckar rinner genom området, delvis i starkt blockig terräng. Enstaka torrakor och lågor ingår.

Buskskiktet är bitvis tätt med hassel. Inslag av olvon, viden, en och brakved förekommer. Fältskikt av frisk örttyp, kruståteltyp och högörttyp.

Areal (ha)	20,1
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	0-8-0-1
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	- (G)

Fauna och flora

Lokal för gulsippa, vårärt, trolldruva, skogsbingel, blåsippa och tandrot. Enligt NÄ förekommer också lundstjärnblomma, hässleklocka, strutbräken, skogsstarr, skärmstarr, underviol, nästrot och myskmadra. Enligt LFF finns även desmeknopp.

På askar förekommer en del ovanliga epifyter såsom lunglav (*Lobaria pulmonaria*) *Parmeliella triptophylla* och *Leptogium saturninum*.

Den omgivande ängsmarken har mycket stora biologiska värden.

Bedömning

En rik växtlokal med flera sällsynta epifyter. Objektet ska ses i ett sammanhang med ängsmarken.

Klass 2.

7208-14 Säggyrd

Skogstyp

Hagmark med blandad lövträd.

Medelgrov ek samdominerar med björk. Inslag av bok. Litet inslag av ask, lönn och al. Beståndet har nyligen gallrats i söder.

Buskskikt av hassel, en och hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	7,2
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	4-1-0-5
Virkesförråd	70
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På ett par gamla lönnar i norr växer lunglav (*Lobaria pulmonaria*) tillsammans med *Leptogium lichenoides*. På askar finns *Parmeliella triptophylla*. På bokarna fanns *Graphis scripta* och *Pertusaria multipunctata/ophtalmiza*.

Bedömning

En hagmark med stora biologiska kvalitétér
Klass 2.

7208-15 Rölle, västra

Skogstyp

Björkskog.

Ett splittrat objekt som ansluter till ädellövs skogen vid Rölle. I norr finns en bäcksänka. Klen till medelgrov björk dominerar med inslag av klibbal och litet inslag av asp. Enstaka torrakor förekommer.

Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	8,3
Ädellövs skog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Relativt rika triviallövs skogar som ansluter till de rika ädellövs skogarna vid Rölle.
Klass 2.

7208-16 Kanåsen, södra

Skogstyp

Ädellövs skog ÄL.

Igenvuxna hagmarker där medelgrov till grov bok dominerar. Inslag av medelgrov gran, ek och ask. Det finns även inslag av asp, björk och al. Beståndet, som är luckigt och betat är mestadels genomgallrad.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp.

Areal (ha)	3,8
Ädellövs skog (%)	50
Trädslagsfördelning	0-4-1-4
Virkesförråd	150
Ålder	U, M, G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

Bedömning

Klass 3.

7208-17 Kanåsen

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov till grov bok dominerar med inslag av medelgrov gran. Inslag även av ask, lind, lönn, asp, björk och al. Beståndet är luckigt och genomgallrat. Enstaka lågor och torrakor ingår.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Areal (ha)	13,2
Ädellövs skog (%)	70
Trädslagsfördelning	0-6-1-2
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7208-18 Kanåsen, norra

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

Medelgrov björk och al dominerar med stort inslag av medelgrov asp. Litet inslag av trädformig sälg. Beståndet är gallrat. Enstaka lågor förekommer.

Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt av fuktig örttyp.

Areal (ha)	4,1
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	140
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7209- 1 Skullen

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov till grov bok dominerar med stort inslag av medelgrov gran och björk.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och krus-tåteltyp.

Areal (ha)	6,6
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	0-7-0-0
Virkesförråd	290
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7209-2 Dalshestre

Skogstyp

Askskog.

I en källpåverkad sluttning, som tills helt nyligen sköttes som slättermark, står mycket glest ställda hamlade askar. Litet inslag av björk och balsampoppel. Objektet är ett mycket vackert exempel på ett askänge av högrörttyp.

Buskskikt saknas. Fältskikt av högrörttyp.

Fauna och flora

Lokal för gulsippa, skogsbingel och smörbollor. I bottenskiktet förekommer *Sphagnum warnstorfi*. På askarna växer *Gyalecta ulmi* rikligt.

Bedömning

Ovanlig skogstyp. Rik botanisk lokal.

Klass 2.

7210-1 Bua backen

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En slänt ned mot sjön Ömmerns sydspets. Medelgrov ek med stort inslag av medelgrov björk och asp. Beståndet är röjt och gallrat och betas delvis.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7210-2 Svedjorna

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En klen skog med ask, ek, asp och björk. Beståndet är något luckigt. Beståndet är röjt och gallrar.

Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,4
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	2-0-2-6
Virkesförråd	60
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7210-3 Jordås, nordöstra

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Grov till mycket grov ek med stort inslag av asp och björk. Beståndet är gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,4
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	130
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7210-4 Jordås

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek är det dominerande trädslaget. Mycket stort (30%) inslag av medelgrov gran. Inslag av asp och björk. Beståndet är något luckigt. Skogen är gallrad och röjd. Enstaka lågor och torrakor ingår.

Areal (ha)	0,4 + 0,5
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-2
Virkesförråd	160
Ålder	U, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 1år)

Buskskikt av rönn. I delområde 4a finns det rikligt med små unggranar i buskskiktet. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

7210-5 Jordås, östra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen ek, asp och björk samdominerar. Även trädformig sälg och rönn förekommer. Beståndet som är något luckigt är gallrat.

Buskskiktet är glest med brakved och viden. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-6
Virkesförråd	35
Ålder	U
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7210-6 Jordås, västra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL delar.

En ung och klen skog av asp, björk och al på gammal slåttermark. Intill stenrösen står hamlad ask samt någon alm och lönn. De ädla lövträden dominerar fläckvis i skogsbrynen.

Buskskikt av brakved och viden. Fältskikt av frisk och fuktig örttyp.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	2-0-4-4
Virkesförråd	70
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

Ulota crispa är mycket vanlig i beståndet. Lunglav påträffades sparsamt på en hamlad ask och på en asp som stod i dess närhet. På stambasen av en äldre ask noterades även *Homalia trichomanoides*.

Bedömning

Klass 3.

7210-7 Jordås, sydöstra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov gallrad ekskog i en kuperad och grovblockig sluttning. Litet inslag av al, asp och björk.

Areal (ha)	1,4
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	180
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

Fältskikt av frisk ört och ristyp.

Bedömning

Klass 3.

7210-8 Nedflo

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov asp dominerar med stort inslag av medelgrov ek och inslag av medelgrov björk. Beståndet är röjt och gallrat. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

7210-9 Brynom

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med inslag av grov gran och tall, asp och björk. Beståndet är gallrat. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskikt av brakved och rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

7210-10 Smedsbonabben

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Beståndet domineras av medelgrov till grov ek med stort inslag av grov tall och inslag av medelgrov asp och björk. Marken är sandig och ligger intill Östra Nedsjön och gränser till en badstrand.. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av en, hassel och rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-8
Virkesförråd	110
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-1
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Areal (ha)	3,5
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-2
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7210-11 Tubbared

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Ett stort område som betas av får. I objektet ingår gamla åkermarker med skogbevuxna stenrösen och steniga partier mellan de gamla åkerlapparna. Trädskiktet domineras av relativ gles medelgrov ekskog med inslag av grov lind, björk och asp. Intill vägen finns en mindre grupp med grova ekar. Sparsamt med lågor och boträd av lind och ek ingår.

Areal (ha)	12,5
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	4-0-0-2
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

Lokal för desmeknopp. På lågorna påträffades *Nowellia curvifolia*. På de äldre ekarna påträffades *Arthonia vinosa* och *Calicium glaucellum*.

Bedömning

I beteshagen ingår grova ädellövträd med en intressant fauna och flora knuten till sig. Klass 2.

7211-1 Brattelid

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av delvis mycket grov lind och medelgrov gran. Inslag av lönn, asp och björk. Beståndet, som betas, är gallrat och kraftledning skär genom skogen. Enstaka boträd och lågor ingår.

Buskskikt av hassel och brakved. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

7211-2 Kaggården

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av medelgrov till grov ask och gran. Litet inslag av lind, lönn, alm, björk och asp. Ask, alm, lind och lönn finns mest i lövängsrester norr om gården. Boträd, lågor och torrträd förekommer.

Areal (ha)	7,0
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	4-0-2-2
Virkesförråd	110
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lokal för vätteros. I grova askar noterades myran *Lasius fuliginosus*. Epifytfloran är rik och välutvecklad med arter som lunglav, *Gyalecta ulmi*, *Caloplaca cerina*, *Nephroma parile*, *Parmeliella triptophylla*, *Peltigera collina* och *Leptogium lichenoides*.

Bedömning

Området har stora biologiska kvalitéer och om lövängsesten restaureras kan området bli ett värdefullt kulturhistoriskt objekt samtidigt som det bevarar ett stort antal känsliga organismer knutna till ädellövskog. Det är sällsynt med lövängsrester i de västra delarna av Borås kommun. Klass 2.

7211-3 Laggaregården

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Grov ek dominerar med mycket stort inslag av medelgrov asp och björk. Beståndet är röjt.

Buskskikt av hassel. Fältskikt a frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	70
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7211-4 Bosgården, norra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov björk med stort inslag av medelgrov asp. Inslag av medelgrov ek och litet inslag av ask. Beståndet är gallrat och betas.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsförslag	1-0-1-4
Virkesförråd	80
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7211-5 Bosgården, södra

Skogstyp

Ekhage, björkhage ÄL delar.

En betad skog som i de östra delarna domineras av björk och i de västra (mot gården) av ek. Träden är klenta till medelgrova. Beståndet har stort inslag av asp och inslag av ask.

Buskskikt dåligt utvecklat med enstaka unga rönnar och granar. Fältskikt av frisk örttyp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	4-0-2-4
Virkesförråd	80
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Mindre hackspett observerades vid besöket. På hamlade askar intill gården växer sparsamt med lunglav och *Peltigera collina* och *Coniocybe pallida*.

Bedömning

Klass 3.

7211-6 Henå

Skogstyp

Ekhage, björkhage, ÄL delar.

En betad åbrink som domineras av medelgrov ek med inslag av asp och björk. Björken kan stundtals dominera. Litet inslag av lind. Intill gården i väster finns grova hamlade askar och några lönnar.

Buskskikt av hassel med inslag av hägg. Fältskikt dåligt utvecklat av frisk örtytp.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	4-0-2-4
Virkesförråd	90
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

Vid besöket observerades stenknäck och mindre hackspett.

På de hamlade askarna finns rikligt med fertil *Antitrichia curtispindula*, *Frullania tamarisci* och *Zygodon baumgartneri* samt lavarna *Peltigera collina*, *Coniocybe pallida*, lunglav (*Lobaria pulmonaria*), *Gyalecta ulmi*, *G. flotowii*. Lunglaven (*Lobaria pulmonaria*) växer även på ett par lönnar.

Bedömning

Klass 3.

7211-7 Rörsjö

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En sedan länge övergiven ekhage med klena till medelgrova ekar. Beståndet domineras av klen till medelgrov asp och björk med stort inslag av ek.

Fauna och flora

Bakom ladugården vid Rörsjö finns en liten lövängs-Rest med flera hamlade askar. På dessa växer lunglav, *Peltigera collina*, *Leptogium saturninum* och *Zygodon baumgartneri*.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-6
Virkesförråd	80
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7211-8 Högsgärde

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Medelgrov till grov ek samdominerar med medelgrov asp och björk. Litet inslag av grov ask. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	110
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7212-1 Holmared, norra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Området utgörs av flera små kullar med berg i dagen på flera platser. Grov till mycket grov ek dominerar med inslag av grov gran och tall. Litet inslag av asp, björk och klen lind och lönn. Beståndet är gallrat. Marken är blockrik och en del mindre bergväggar ingår. Enstaka boträd och lågor förekommer.

Buskskikt av hassel, en, oxel och rönn. Fältskikt av Frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-1
Virkesförråd	100
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

7212-2 Holmared, södra

Skogstyp

Ekhage.

En luckig ekhage med dominans av grov ek. Inslag av medelgrov tall, gran, asp och björk. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av krus-tåteltyp.

Fauna och flora

Enligt Svante Hultengren växer här: *Gyalecta ulmi* och *Lobaria pulmonaria*. En kollekt av lunglaven från denna lokal finns i Lars Arvidssons herbarium; Göteborg.

Areal (ha)	4,8
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-1-2
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	M (bitvis S)
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7212-3 Björkered

Skogstyp

Björkskog.

I en sydvänd slänt vid Björkered växer ett klen och något lockigt bestånd av björk med ett litet inslag av tall och gran.

Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsförslag	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7213- 1 Näs, västra

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Medelgrovt till grovt ek dominerar med mycket stort inslag av grovt björk. Litet inslag av ask, bok och lind. Enstaka boträd förekommer.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,5
Ädellövsskog (%)	50
Trädslagfördelning	5-0-1-4
Virkesförråd	130
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7213-2 Näs, östra

Skogstyp

Blandskog av triviallövt.

Två dungar i ett åkerbrukslandskap. Aspen dominerar men inslaget av björk är mycket stort.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-1 Börshult, södra

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

Klen till medelgrov björk och asp dominerar. Inslag av klen till medelgrov gran. Litet inslag av trädformig rönn och sälk samt klen ek och bok. Beståndet är gallrat och betas delvis.

Buskskikt av hassel, brakved och viden. Fältskikt av Frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-8
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-2 Börshult, mellersta

Skogstyp

Ekhage ÄL.

Medelgrov ek dominerar med stort inslag av asp och björk. I buskskiktet finns det ställvis mycket tätt med sly av asp och björk. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskiktet är mycket glest med enstaka nypon. Fältskikt av frisk örttyp

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,8
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-3 Börshult, norra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med mycket stort (30%) inslag av gran och inslag av asp och björk. Litet inslag av klen ask. Enstaka lågor ingår. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-2
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-4 Kyrkebo, södra

Skogstyp
Hedekskog ÄL.

Grov ek dominerar med inslag av björk och trädformig rönn. En kraftledning skär genom beståndet.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	190
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

7214-5 Kyrkebo, mellersta

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov björk och asp dominerar med inslag av medelgrov ask och ek. Litet inslag av lönn och fågelbär. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	1-0-2-7
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-6 Kyrkebo, norra

Skogstyp
Björkskog.

Klen till medelgrov björk dominerar med mycket stort inslag (30%) av klen till medelgrov asp. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,9
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-7a Bäckäng

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.

En blockig östbrant med en liten bäck. Asp och björk dominerar och nedanför branten, längs bäcken, finner man inslag av al och ask.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	0-0-6-4
Virkesförråd	110
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örtyyp.

Fauna och flora

Lokal för blåsippan, tandrot och vätteros. På blocken finns en rik mossflora med arter som *Rhytidiadelphus loreus*, *Barbilophozia barbata*, *Eurhynchium striatum* och *Ptilidium crista-castrensis*.

Bedömning

Rik flora.

Klass 2.

7214-7b Slättaryd

Skogstyp

Blandskog av triviallöf.

En fuktig slänt där klen till medelgrov björk, al och asp dominerar. Litet inslag av klen ask. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örtyyp.

Areal (ha)	1,0
Ädellövsfog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7214-8 Bäckäng, norra

Skogstyp

Björkskog.

Klen till medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen till medelgrov asp. Inslag av tall, gran och trädformig rönn. Marken är delvis källpåverkad. Beståndet är delvis avverkat och gallrat. Delvis bete.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örtyyp.

Areal (ha)	2,2
Ädellövsfog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	140
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7214-9 Varvhult

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

Klen till medelgrov björk, asp och al samdominerar. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örtyyp.

Areal (ha)	8,0
Ädellövsfog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7214-10 Hallagärde

Skogstyp

Björkskog.

Klen till medelgrov björk med stort inslag av klen till medelgrov asp. Litet inslag av klen al och trädformig sälj och rönn. Beståndet är röjt och gallrat och betas svagt.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,0
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	110
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-11 Hallagärde, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar tillsammans med medelgrov björk och asp. Beståndet, som är något luckigt, är röjt och gallrat.

Buskskikt av brakved, hägg och rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,1
Ädellövsskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	110
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7214-12 Hallagärde, västra

Skogstyp

Blandskog av triviallövv.

Medelgrov asp och björk dominerar denna täta och likformiga skog. Beståndet är röjt och gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,5
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

7214-13 Sandhult

Skogstyp
Björkskog.

Klen till medelgrov björk dominerar men inslaget av klen till medelgrov trädformig sälk och asp är stort. Inslag av klen till medelgrov al. Beståndet är luckigt. Marken är delvis källpåverkad. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,5
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	120
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-14 Sundshult

Skogstyp
Ekhage ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar helt denna beteshage.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	160
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 2 år)

7214-15 Pålsbo, södra

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov björk och asp dominerar denna skog. Inslag av, delvis grov tall, ek och lind. Litet inslag av al. Beståndet är gallrat och betas delvis. Enstaka lågor ingår.

Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av krus-tåteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,5
Ädellövsskog (%)	20
Trädslagsfördelning	1-0-1-7
Virkesförråd	150
Ålder	U, M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

7214-16 Pålsbo, norra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av medelgrov gran. Inslag av medelgrov björk. Beståndet är gallrat och betas delvis.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-1
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7214-17 Bäckabo

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

En starkt igenvuxen björkhage med stort inslag av asp. Mot åkerkanten i väster står några grova, hamlade, lindar och askar. Litet inslag av ek, al och gran.

Buskskikt av en och hassel. Hasseln är grov och döende i den starka skuggan. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	1-0-1-7
Virkesförråd	90
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7214-18 Nordtorp

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek med stort inslag av grov gran. Litet inslag av ask, fågelbär, björk och asp. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-1
Virkesförråd	180
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7214-19a Öndered, mellersta

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov gran, ask och björk. Litet inslag av asp och al. Beståndet är röjt. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt saknas men i den nivån hittar man tätt med unggranar. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,2
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-1-1
Virkesförråd	150
Ålder	U, M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-19b Öndered, norra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov björk, asp och al dominerar med stort inslag av medelgrov gran. Inslag av tall och ett litet hörn med hagmarksekar (delområde (19c)).

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	7,5
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-8
Virkesförråd	130
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-20 Öndered, östra

Skogstyp

Björkskog.

Klen björk dominerar med inslag av klen asp och inslag av klen al och sälg. Beståndet är röjt och gallrar och betas delvis.

Buskskikt av rönn, viden, brakved och hägg. Fältskikt av frisk örtytp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,3
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	70
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-21 Pujebo

Skogstyp

Blandskog med ädellövsinlag.

Klen till medelgrov asp och björk dominerar med stort inslag av klen till medelgrov ek. Litet inslag av fågelbär och lind. Beståndet betas svagt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	2-0-1-7
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7214-22 Bua

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Klen till medelgrov ek dominerar med stort inslag av klen till medelgrov björk, asp och al. Litet inslag av lind, lönn och fågelbär. Beståndet betas svagt. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av hassel och brakved. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	4-0-1-4
Virkesförråd	100
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7215-1 Gräskärr

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

Klen björk och asp med inslag av klen al, gran, tall och sälg. Beståndet är röjt och gallrat. Delvis bete.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,2
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-8
Virkesförråd	70
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7215-2 Källäng

Skogstyp

Björkskog.

Klen björk dominerar med stort inslag av klen asp.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	9,2
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	60
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7215 -3 Fagerhult, södra

Skogstyp

Hedekskog, trivialblandskog, ÄL delar.

En blockrik slänt med medelgrov till grov ek med stort inslag av gran och litet inslag av grov tall och björk. Torrträäd och lågor av björk förekommer.

Buskskikt är glest med asplys och brakved. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	1,9
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-1
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

Bedömning

Klass 3.

7215-4 Fagerhult, norra

Skogstyp

Askskog ÄL.

I en blockig sluttning öster om gården finns en degenererad löväng med hamlade askar. Träden är medelgrova till grova. Inslaget av ek och lönn är stort. Beståndet har sparats vid en avverkning och objektet omges idag helt av hyggen och ängsmarker. Branten har använts som lokal soptipp vid gården.

Buskskikt glest med hassel och hägg. Fältskikt torr till frisk örttyp.

Areal (ha)	1,3
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	3-0-7-0
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Lokal för stinksyska. På en grov ask fanns *Gyalecta ulmi*.

Bedömning

Grova delvis innanrötade ädellövträd. Lövängsrest av för traktens typisk utformning.

Klass 2.

7215-5 Örekullen

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Branta och blockrika sluttningar ned mot Öresjön som är bevuxna med medelgrov till grov ek med stort inslag av grov gran och litet inslag av asp, björk och lind.

Areal (ha)	2,3
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	6-0-1-1
Virkesförråd	230
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt glest med hassel och brakved. Fältskikt av frisk ristyp och frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

7215-6 Kypered

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En sluttning där grov ek dominerar med stort inslag av grov gran. Inslag av grov asp och björk. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av en och rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-2
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7215-7 Sjöbo

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Detta bestånd består uteslutande av medelgrov till grov ek. Beståndet betas svagt och har stor betydelse för landskapsbilden.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7215-8 Sjöbo, norra

Skogstyp

Björkskog.

Medelgrov till grov björk dominerar med stort inslag av medelgrov till grov al.

Buskskiktet är tätt med hägg och rönn. Fältskikt av fuktig örttyp.

Fauna och flora

Enligt LFF häckar mindre hackspett.

Areal (ha)	8,3
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	230
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7215-9 Sjöbo, västra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov till grov björk dominerar med stort inslag av medelgrov till grov ek och al. Inslag av medelgrov gran. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är tätt med brakved, hägg och rönn. Fältskikt av frisk örtyp.

Areal (ha)	12,2
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-7
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7215-10 Sjöbo, södra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen björk dominerar tillsammans med medelgrov ek och al. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av brakved och hägg. Fältskikt av frisk örtyp.

Areal (ha)	3,7
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-8
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G, F

Bedömning

Klass 3.

7216-1 Alidedal

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Ett litet bestånd runt en husruin. Ask och björk är de vanligaste trädslagen men inslaget av klen lönn är stort. Inslag av medelgrov ek och litet inslag av grov alm. Delobjekt (b) består mest av klen björk och sälg på gamla åkrar.

Buskskikt av brakved och hägg. Fältskikt av frisk örtyp.

Areal (ha)	0,6 + 1,5
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	1-0-5-4
Virkesförråd	50
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7216-2 Rävryd

Skogstyp

Alskog.

Detta bestånd, som ligger intill en liten bäck, domineras av klen till medelgrov al med inslag av klen asp, björk och sälg.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	100
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7216-3 Frufällan, södra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En ungskog som domineras av björk med stort inslag av klen ek och al. Litet inslag av ask och lönn.

Buskskikt glest med viden och rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,9
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	3-0-1-8
Virkesförråd	100
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7216-4 Kulgrav

Skogstyp

Askskog ÄL.

Utefter den lilla körvägen mot söder från gården står grov hamlad ask och någon grov alm. Askarna har i en svacka fröspridit sig och utbildat en klen till medelgrov askskog. Litet inslag av ek och björk. Delområde (b) domineras av ung ek.

I buskskiktet står en tät pinnskog av unga askar varför egentligt buskskikt saknas. Fältskikt friskt till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lokal för skogsbingel. På de hamlade askarna intill vägen påträffades *Gyalecta ulmi* och *G. flotowii*.

Bedömning

Ovanlig skogstyp.

Klass 2.

Areal (ha)	1,1 + 1,1
Ädellövskog	90
Trädslagsfördelning	4-0-5-1
Virkesförråd	150
Ålder	U, M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7216-5 Frufällan

Skogstyp

Björkskog.

En brant västsluttning där medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen asp och inslag av klen till medelgrov ek. Enstaka torrakor ingår.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	7,8
Ädellövsskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-9
Virkesförråd	110
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7216-6 Tosseryd, södra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

En slänt där grov ek dominerar med inslag av ask och klen björk. Granen har avverkats i området. Enstaka torrakor ingår.

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,2
Ädellövsskog (%)	90
Trädslagsfördelning	8-0-1-1
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7216-7 Tosseryd, norra

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Grov ek dominerar med stort inslag av medelgrov björk och litet inslag av ask. Beståndet betas svagt. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	8,2
Ädellövsskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	R

7216-8 Tosseryd, östra

Skogstyp

Blandskog med ädellövsinslag.

Medelgrov ek, gran och björk samdominerar i denna slänt som leder ner till en liten bäck.

Areal (ha)	2,5
Ädellövsskog (%)	30
Trädslagsfördelning	3-0-0-4
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

7216-9 Hjältagården

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Klen till medelgrov ekskog med inslag av klen asp och björk. Beståndet betas i stora delar. Området är blockrikt och småkulligt och innesluter en del ängsmark.

Buskskikt hassel med inslag av en och nypon. Fältskikt frisk ristyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	4,0
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7216-10 Snökulla

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov al dominerar med stort inslag av gran och björk. Litet inslag av medelgrov ask. Beståndet är gallrat. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt är av fuktig örtytp.

Areal (ha)	1,7
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-7
Virkesförråd	130
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7216-11 Främgårde, Borhult

Skogstyp

Alskog.

Klen till medelgrov al med inslag av asp och björk. Litet inslag av ask. Området som till största delen betas har gallrats och dränerats med dikningar.

Buskskikt glest med viden. Fältskikt fuktig till våt örtytp.

Areal (ha)	10,2
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	170
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G, F

Bedömning

Klass 3.

7216-12 Borhult, västra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov asp och björk. Beståndet är röjt och betas svagt.

Buskskikt av en och rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,6
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	-
Ålder	M, G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7216-13 Borhult, östra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

Utmed bäcken växer en klen till medelgrov skog med al, björk och asp. Stort inslag (ca 40%) av klen till medelgrov ask. Litet inslag av ek, fågelbär och lind. Området betas och innesluter en del öppna ängsmarker.

Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av fuktig till våt örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,1
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	0-0-5-5
Virkesförråd	-
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7216-14 Eskilsryd

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Grov ek dominerar detta bestånd som har inslag av medelgrov björk. Litet inslag av grov bok, lärk och trädformig rönn. Beståndet, som är luckigt, är gallrat och betas svagt.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,1
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7216-16 Svinåsa

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov till grov al och asp. Litet inslag av grov björk. Beståndet är gallrat. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örtristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	25,3
Ädellövs-kog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7217-1 Hjortsered

Skogstyp

Ängsekskog, alskog, ÄL delar.

Slutningen mellan Fölabäcken och Hjortsered är bevuxen med medelgrov till grov ekskog med inslag av klen till medelgrov ask. Intill bebyggelsen står några grova hamlade askar. Litet inslag av medelgrov lönn och lind. Mot bäcken dominerar alen och här finns stort inslag av björk. Hela området betas och de södra delarna är kraftigt gallrade. Den norra delen är gles och något luckig till följd av röjningsarbeten. Mindre bäckar och källdråg finns.

Areal (ha)	13,2
Ädellövs-kog (%)	70
Trädslagsfördelning	5-0-2-3
Virkesförråd	120
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt hassel med inslag av en och brakved. Fältskikt frisk till fuktig örtytp.

Fauna och flora

Lokal för stinksyska, kärffibbla, ormbär, skogsbingel och blåsippa.

I källdrågen finner man mossor som *Thuidium tamariscinum*, *Eurhynchium striatum*, *Marchantia aquatica* och *Brachythecium plumosum*.

På en ek hittades sparsamt med lunglav och på flera ekar växer rikligt med den nordliga laven *Lopadium disciforme* tillsammans med *Micarea prasina*, *Dimerella pineti* och *Zygodon baumgartneri*. På en hamlad askbas påträffades *Parmeliella triptophylla*.

Bedömning

Stort bestånd med ädellövs-kog.

Klass 2.

7217-2 Råssered

Skogstyp Ängsekskog ÄL.

Grov ek dominerar med inslag av grov björk och asp. Beståndet, som är luckigt, är gallrat och röjt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,2
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

7217-3 Fölsjömossen

Skogstyp Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov till grov asp och björk dominerar med stort inslag av medelgrov till grov ek. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,7
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	3-0-0-7
Virkesförråd	180
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

7217-4 Gretlanda, sydväst

Skogstyp Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av medelgrov asp och björk. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av brakved, rönn och enstaka hassel. Fältskikt av frisk ört/ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,1
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	220
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 5 år)

7217-5 Gretlanda, södra

Skogstyp Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov björk och asp. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av hassel, rönn och brakved. Fältskikt av frisk ristyp.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7217-6 Ormåsa, västra

Skogstyp

Ekhage, björkhage.

Medelgrov ek och medelgrov björk dominerar växelvis. Inslag av medelgrov asp. Beståndet är gallrat.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,1
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7217-7 Ormåsa, mellersta

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Klen till medelgrov ek dominerar. Litet inslag av ung gran. Beståndet är gallrat och en kraftledning skär genom objektet.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7217-8 Främgårde, västra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov till grov askskog med stort inslag av medelgrov ek och björk. Litet inslag av grov ask och asp samt medelgrov lind. Området betas till största delen. Källpåverkad mark ingår.

Buskskikt tätt med hassel och stort inslag av brakved och hägg. Fältskikt fuktig till våt örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	2-0-2-6
Virkesförråd	130
Ålder	M, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7217-9 Främgårde, östra**Skogstyp**
Björkhage.

Medelgrov björk med inslag av medelgrov asp och al.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,4
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	U, M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7217-10 Främgårde, centrala**Skogstyp**
Ekhage.

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov björk och asp. Beståndet har en viss betydelse för landskapsbilden.

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3

Areal (ha)	7,5
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	120
Ålder	M, G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7217-11 Sörbo**Skogstyp**
Ängsekskog, ekhage, ÄL.

Grov ek dominerar med inslag av grov björk och asp. Litet inslag av grov al. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,1
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7217-12 Granelund**Skogstyp**
Björkhage, ekhage.

Grov ek och björk dominerar växelvis. Inslag av grov al och medelgrov asp. Litet inslag av klen lönn. Beståndet är röjt och gallrat.

Areal (ha)	4,2
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-6
Virkesförråd	80
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt av en, brakved, hägg, rönn och viden. Fältskikt av frisk och fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

7217-13 Häljared, Västergården

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov till grov ekskog med stort inslag av grov gran. Litet inslag av asp, björk och al. Enstaka lågor förekommer. Området är genomgallrat och betat.

Buskskikt glest med hassel. Fältskikt frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	6,4
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-1
Virkesförråd	250
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

Bedömning

Klass 3.

7217-14 Häljared, Västergården - norra

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov till grov, gallrad alskog med stort inslag av medelgrov björk. Litet inslag av gran och ask. Beståndet är till största delen betad. Enstaka lågor bl.a av ask, förekommer.

Buskskikt saknas men en del ungträd av rönn påträffades. Fältskikt av fuktig till våt örttyp.

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G, F (om 10 år)

Bedömning

Klass 3.

7217-15 Häljared, Västergården - södra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Ett blandbestånd av betad och gallrad, medelgrov till grov al- och granskog med stort inslag av ek, som till en del har grova dimensioner. Lågor och torrakor av asp, björk, al och ek förekommer.

Buskskikt av hassel och hägg med inslag av brakved. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	7,5
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-4
Virkesförråd	300
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Grova ädellövträd där även lågor och torrakor av dessa trädslag ingår är en sällsynt och värdefull miljö.

Klass 2.

7217-16 Häljared

Skogstyp

Askskog ÄL.

En mycket stor askdominerad lövängsrest som tillsammans med talrika, för länge sedan nedlagda, små åkerlappar betas. Asken bär spår av hamling och är delvis av grova dimensioner. På torrare mark är inslaget av ek stort. Inslag av alm, lind, asp, björk och al. Området sluttar ned mot en liten bäck. Lågor och högstubbar förekommer. Trädskiktet är gallrat och relativt glest.

Areal (ha)	7,1
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	3-0-0-5
Virkesförråd	280
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt av hassel. Fältskikt av friska, fuktiga och våta örttyper.

Fauna och flora

Liten flugsnappare hördes vid besöket. Lokal för olvon, strutbråken, ormbär, blåsippa och skogsbingel.

Lunglaven (*Lobaria pulmonaria*) förekommer rikligt i området på över 30 olika träd och den noterades på ask, alm, ek och sälg. Av övriga epifyter kan nämnas almlav (*Gyalettra ulmi*) på ask och alm, *Gyalecta flotowii* på alm, *Parmeliella triptophylla*, *Bacidia fusca*, *Micarea lignaria*, *Leptogium lichenoides*, *Coniocybe sulphurea*, *Zygodon baumgartneri*, *Neckera complanata*, *Homalia trichomanoides*, *Antitrichia curtispindula* och *Pylaisia polyantha*.

Bedömning

En av de finaste lövängsresterna i länet. Rik fauna och flora.

Klass 1.

7217-17 Häljared, norra

Skogstyp

Hedekskog, ekhage, ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av medelgrov björk, asp och al. Litet inslag av klen ask. Beståndet är gallrat och betas delvis.

Buskskikt av en, hassel, brakved, rönn och viden.

Fältskikt av kruståteltyp och fuktig örttyp.

Areal (ha)	17,6
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7218-1 Gravryd

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Grov ek dominerar med inslag av medelgrov asp, björk och al. Beståndet är gallrat och delvis avverkat. Delvis bete. Ett mindre vattendrag ingår.

Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	17,2
Ädellövsskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	190
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7218-2 Falskog

Skogstyp

Blandskog med ädellövsinslag (ÄL delar).

En fuktig sluttning där ek, ask, al och björk samdominerar. Inslag av alm, asp och fågelbär. I mer torra partier dominerar eken och i fuktigare lägen står mest björk och al med ett stort inslag av ask. Träden är genomgående klenta till medelgrova. Beståndet är delvis gallrat och dikat och en kraftledningsgata skär genom området. En liten bäck rinner genom beståndet.

Buskskiktet är välutvecklat och tämligen tätt med framförallt hassel med inslag av hägg, olvon och brakved. Fältskikt är av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lokal för blåsippan, ormbär, skogsbingel och smörbollor. Enl A & E förekommer även getrams.

Av markmossor kan nämnas kransmossan (*Rhytidiadelphus triquetrus*) och *Thuidium philiberti*. Epifytfloran är välutvecklad med arter som *Parmeliella triptophylla*, *Neckera complanata*, *Porella platyphylla*, *Antitrichia curtispindula* och *Pylaisia polyantha*.

Bedömning

En ovanlig skogstyp med rik flora.

Klass 2.

Areal (ha)	3,4
Ädellövsskog (%)	60
Trädslagsfördelning	2-0-4-4
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7218 -3 Falskog, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av grov asp och björk. Beståndet är gallrat.

Areal (ha)	1,9
Ädellövsskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	120
Ålder	M. G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

Buskskikt av en och brakved. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

7218-4 Holmen, Rångedala socken

Skogstyp

Ädellövskog ÄL.

Grov ek dominerar med mycket stort inslag av grov björk. Inslag av grov bok, ask och lind. Beståndet är luckigt och betas svagt. Enstaka lågor och torrakor ingår.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örtyyp.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	4-1-2-3
Virkesförråd	100
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

På askar intill vägen förekommer silverlaven (*Parmelia tiliacea*) rikligt.

Bedömning

Grov ädellövskog med vissa botaniska värden.

Klass 2.

7218-5 Skogslätt

Skogstyp

Björkskog.

Klen till medelgrov björk med stort inslag av klen till medelgrov asp och al. Beståndet är röjt och betas svagt.

Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk örtyyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	5,1
Ädellövskog (%)10	
Trädslagsfördelning	1-0-0-9
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7218-6 Lill-Aspered och dungar runt Äspered

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medelgrov björk. Beståndet betas svagt.

Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Areal (ha)	16,4
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	90
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7218-7 Bosgården - Lövåsen

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov ekskog med stort inslag av medelgrov gran och inslag av asp och björk. Litet inslag av ask. Området utgörs av sedan länge igenvuxna ekhagar.

Buskskikt av hassel med inslag av en. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Stort lövskogsområde.

Klass 2.

Areal (ha)	43,0
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-3
Virkesförråd	60
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7218-8 Gullestorp

Skogstyp

Bokskog, hedekskog, ÄL.

Igenväxla hagmarker med bok och ek. Delområde (b) domineras av ek och (a) av bok. Träden är medelgrova till grova och det finns inslag av björk. Beståndet, som är luckigt, betas svagt. Enstaka högstubbar ingår.

Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av frisk ristyp.

Bedömning

Klass 3

Areal (ha)	5,3
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	4-5-0-1
Virkesförråd	110
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7218-9 Smedsgården, västra

Skogstyp

Alskog.

Stora slåtter- och betesmarker som har vuxit igen med triviallövskog. Medelgrov al med stort inslag av björk. Litet inslag av gran, asp och ask. Beståndet är delvis gallrat.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved och viden. Fältskikt av våt till fuktig ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	11,2
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-9
Virkesförråd	200
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (0m 5 år)

7218-10 Smedsgården, östra

Skogstyp
Hedekskog ÄL.

Ett litet parti med framgallrad, medelgrov ek som ansluter till öppen åkermark. Stort inslag av al och björk. Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig ristyp.

Bedömning
Klass 3.

Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	200
Ålder	M, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

7218-11 Taryd

Skogstyp
Ängsekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar men inslaget av medelgrov asp, björk och al är stort. Litet inslag av klen gran. Beståndet är luckigt, gallrat och röjt samt betas svagt. Ett mindre vattendrag ingår. Buskskikt av brakved, rönn och viden. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning
Klass 3.

Areal (ha)	9,3
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	5-0-0-5
Virkesförråd	-
Ålder	M, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7219-1 Sundholmen, Hennyland

Skogstyp
Alskog.

Klen till medelgrov al med mycket stort inslag av klen till medelgrov björk. Beståndet är röjt och grävda diken ingår. Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Bedömning
Klass 3.

Areal (ha)	14,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	100
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7219-2 Tångagårdeshagen

Skogstyp
Blandskog med ädellövinslag.

Sedan länge igenvuxna slåttermarker med medelgrov björk och medelgrov till mycket grov asp. Stort inslag av al och litet inslag av, delvis grov, ek och ask. Beståndet är delvis gallrat.

Areal (ha)	16,2
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	2-0-0-8
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

Buskskikt av hassel med inslag av brakved och hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Stora arealer domineras av skogsbingel. Lokal för gulsippa.

På en gammal ask intill gården finns lunglav (*Lobaria pulmonaria*).

Bedömning

Triviallövskog med rik jordmån och med mycket grov asp.
Klass 2.

7219-3 Storegården

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

Klen till medelgrov ask, ek, al och björk. Litet inslag av klen alm. Området är delvis röjt för bete men vid röjningen har man lämnat en del medelgrov ek och ask framförallt i söder.

Buskskikt av hassel. Buskarna är unga då de nyligen har röjts. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lokal för skogsbingel.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	10,5
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	2-0-3-5
Virkesförråd	90
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	F (om 1 år)

7219-4 Harekulla

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

Medelgrov asp dominerar men inslaget av medelgrov björk är mycket stort (40%). Beståndet är gallrat och betas svagt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,4
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	0-0-6-1
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7219-5 Sjöhagen

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag, ängsekskog, ÄL.

En tät och risig ädellövblandskog med frodig vegetation på fuktig översilningsmark. Medelgrov till grov ek och ask med stort inslag av klen gran och litet inslag av medelgrov alm. Litet inslag finns även av klen till medelgrov lönn, al och björk. Partier med ekdominans förekommer. Området betas.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg och nypon. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	7,7
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	3-0-3-2
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Lokal för blåsippan, gulsippa, skogsbingel, hässleklocka, gullpudra och ormbär. På ask och alm finns lunglav (*Lobaria pulmonaria*) och på en ask *Parmeliella triptophylla*.

Bedömning

Äldre ädellövskog med rik flora.
Klass 1.

7219-6a Holmen

Skogstyp

Bokskog ÄL.

En delvis storblockig slänt ned mot sjön Tolken. Grovstammig bok med stort inslag av grov ek. Litet inslag av lönn och ask. Grova lågor och högstubbar av ek och bok förekommer. Området är nyligen gallrat varvid en del av de biologiska kvalitéerna tyvärr har försvunnit då gallringen har inriktats på sjuka och skadade träd.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bestånd 6A + 6B	
Areal (ha)	2,0 + 13,5
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	7-0-3-0
Virkesförråd	220
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

Invid ett litet bäckdrag växer strutbräken och kransrams. Lokal för skogsbingel och tandrot. På några bokar i slutningen påträffades lunglav (*Lobaria pulmonaria*).

Bedömning

Grova ädellövträd med rik fauna och flora knuten till denna skogstyp.
Klass 1.

7219-6b Holmen, norra

Skogstyp

Ask-alm-skog ÄL.

Klen till grov ask och alm med inslag av ek och lönn. De grova askarna och almarna bär spår av hamling.

Buskskikt av hassel med inslag av hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Skogsbingeln dominerar över stora ytor i skogen, speciellt nedanför vägen.

På en grov, hamlad ask påträffades fertil lunglav och *Gyalecta ulmi*. Lokaler med fertil lunglav är mycket sällsynta i Sverige och det torde inte finnas mer än ett tiotal.

Bedömning

Ovanlig skogstyp med rik flora..

Klass 2.

7219-7 Sjötorp

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Grov bok dominerar. Delområde (b) består av ung björkskog. Inslag av grov ek. Beståndet är gallrat och granen har avverkats.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och frisk örttyp.

Fauna och flora

Lokal för skogsbingel (A & E).

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,5 + 3,0
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	1-9-0-0
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7219-8 Blixnabb, Lerbäck

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov till grov bok dominerar med stort inslag av medelgrov asp.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	5,0
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-3
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7219-9 Askanäs

Skogstyp

Bokskog ÄL.

Medelgrov till grov bok med inslag av grov ek. Litet inslag av björk. Området har nyligen gallrat varvid granen har tagits bort.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Fauna och flora

Liten flugsnappare sjöng vid besöket. Lokal för skogsbingel

Bedömning

En ovanlig skogstyp med äldre bok och ek.
Klass 2.

Areal (ha)	14,5
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	1-9-0-0
Virkesförråd	180
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7222-1 Slätthult

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen till medelgrov björk och asp dominerar med inslag av medelgrov ek och klen gran. Beståndet är luckigt och betas delvis.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-8
Virkesförråd	50
Ålder	U
Bonitet	S, M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7222-2 Torstad

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Beståndet ligger intill en liten såg vid en damm och ett litet vattenfall. Medelgrov asp, björk och al dominerar med inslag av medelgrov ek. Litet inslag av grov ask och lönn. Beståndet är röjt och gallrat och betas svagt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	1-0-1-8
Virkesförråd	110
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7224-1 Löväng, västra

Skogstyp

Blandskog av trivialtyp.

En igenvuxen björkhage där granen nu växer upp mellan björkstammarna. Medelgrov till grov björk med inslag av klen och ung gran. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G, F (om 15 år)

Bedömning

Klass 3.

7224-2 Löväng, östra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag ÄL.

Klen till medelgrov björk, al och asp med stort inslag av delvis grov ask, Litet inslag av bok, lönn och fågelbär. Området är kraftigt gallrat sedan beskrivningen gjordes.

Buskskikt är tätt med hassel, brakved och hägg. Fältskikt fuktig örttyp.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	0-1-4-5
Virkesförråd	60
Ålder	U, G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N, D
Åtgärdsförslag	R

Bedömning

Klass 3.

7224-3 Granholmen

Skogstyp

Björkskog.

Området är en igenväxt slätteräng bakom gården med en liten bäck. Medelgrov björk med litet inslag av grov lönn och ask.

Buskskikt glest med vide. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Areal (ha)	2,5
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-9
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7224-4 Skåpeslätt

Skogstyp

Björkhage.

I slutningen ned mot den lilla sjön Abborasjön finner man en björkhage med inslag av fågelbär åkerkanten.

Buskskikt av en. Ett mycket stort trädformigt exemplar förekommer. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

7224-5 Aplakulla, västra

Skogstyp

Ekskog ÅL.

Medelgrov ek på en bergknalle med en del branta sluttningar. Litet inslag av asp, björk, alm, ask, lind och fågelbär.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved. Fältskikt av frisk till torr örttyp.

Areal (ha)	2,0
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	7-0-1-2
Virkesförråd	160
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

Lokal för vätteros.

På trädbaser förekommer mossorna *Neckera complanata* och *Porella platyphylla*. På hållarna förekommer *Collema flaccidum*. I en ihålig ask påträffades myran *Lasius fuliginosus*.

Bedömning

Klass 3.

7224-6 Värnasjöhult

Skogstyp

Trivialblandskog med ädellövinslag.

En röjd björkskog ned mot Värnasjön med inslag av asp och fågelbär. Litet inslag av tall, ek, ask och lönn.

Buskskikt av grov rönn. Fältskikt av frisk örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,5
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	1-0-4-5
Virkesförråd	90
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7224-7 Mötesbron

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen till medelgrov björk och asp dominerar med inslag av klen ek, lönn och al. Beståndet är gallrat och betas svagt. Grävda diken förekommer.

Buskskikt av sälg och viden. Fältskikt av fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,0
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	0-0-1-9
Virkesförråd	130
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7225-1 Aplakulla

Skogstyp

Askskog ÄL.

En stenig och fuktig brant intill gårdarna med grov före detta hamlad ask och alm. Stort inslag av grov ek i höjdlägen. Grova lågor av ask och alm förekommer rikligt.

Buskskikt av hassel med inslag av brakved. Fältskikt av frisk till fuktig örtytp.

Areal (ha)	1,6
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	5-0-4-0
Virkesförråd	100
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Fauna och flora

Lokal för gullpudra, blåsippan, desmeknopp och vårlök. Enligt NÄ förekommer trolldruva. Rik epifytflora med *Gyalecta ulmi*, *Porella platyphylla*, *Neckera complanata* och *Parmelia acetabulum*.

Bedömning

En typisk västsvensk lövängsrest.

Klass 2.

7225-2 Hjälmaryd

Skogstyp

Ängsekskog ÄL

Medelgrov ek dominerar med mycket stort (40%) inslag av medelgrov björk. Beståndet är gallrat och betas svagt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp och frisk örtytp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	8,0
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	170
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7225 -3 Tomten

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Grov till mycket grov ek. Beståndet är glest och kronorna är vida. Beståndet är gallrat. Området fungerar som närströvsområde för befolkningen Bredared.

Buskskikt av rönn och viden. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	3,3
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	170
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

Fauna och flora

På kyrkogården intill växer lunglav (*Lobaria pulmonaria*) och i den fridlysta askallén växer laven *Caloplaca chlorina*.

Bedömning

En socialt värdefull ekskog.
Klass 2.

7225-4 Hulu

Skogstyp

Björkskog.

En välgallrad medelgrov björkskog. Marken är delvis källpåverkad.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	21,9
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	150
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7225 -5 Ekhult

Skogstyp

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov ek dominerar med stort inslag av klen asp. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är glest med enar. Fältskikt av kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	6,1
Ädellövskog (%)	70
Trädslagsförslag	7-0-0-3
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	MG
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7225-6 Storängen**Skogstyp**

Björkskog.

Klen björkskog med inslag av klen asp. Beståndet är röjt. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk örttp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	3,7
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	100
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7225-7 Holmåsa, södra**Skogstyp**

Alskog.

En medelgrov betad alskog med delvis källpåverkad mark.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,1
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7225-8 Holmåsa, norra**Skogstyp**

Ängsekskog ÄL.

Medelgrov till grov ek dominerar med mycket stort (40%) inslag av björk. Litet inslag av klen gran. Området betas svagt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,1
Ädellövsskog (%)	60
Trädslagsfördelning	6-0-0-4
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7225-9 Hult**Skogstyp**

Blandskog med ädellövsinslag.

Detta är en igenväxande ekhage med mycket stort inslag (40%) av klen björk. Inslag av trädformig sälg och al och asp. Beståndet är röjt.

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,0
Ädellövsskog (%)	30
Trädslagsfördelning	3-0-0-7
Virkesförråd	150
Ålder	U
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7225-10 Risabo

Skogstyp

Hedekskog, ekhage, ÄL.

En delvis betad ekskog med medelgrova till grova träd. Beståndet växer på en slänt ned mot en liten bäck. I branterna ned mot backen står enstaka alm, ask och lind. Litet inslag av klen asp.

Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av torr till frisk örtyyp.

Areal (ha)	6,6
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	F (om 10 år)

Fauna och flora

Lokal för desmeknopp och blåsippan.

På ett par almar växer lunglav (*Lobaria pulmonaria*) tillsammans med *Homalia trichomanoides*.

Bedömning

Ett stort område med ädellöv i ett lövskogsfattigt höjdläge. Rik flora.
Klass 2.

7225-11 Segerstorp

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En medelgrov askskog med stort inslag av medelgrov ask, alm och björk. Beståndet, som är gallrat, står delvis i en källpåverkad sluttning.

Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örtyyp.

Fauna och flora

Lokal för ormbär.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	4,2
Ädellövskog (%)	20
Trädslagsfördelning	0-0-2-8
Virkesförråd	180
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	MG
Åtgärdsförslag	G

7225-12 Habeltorp

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen björk dominerar med inslag av klen ek.

Marken är delvis källpåverkad.

Buskskikt av brakved. Fältskikt av fuktig örtyyp.

Areal (ha)	6,9
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-9
Virkesförråd	80
Ålder	U
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7225-13 Röl

Skogstyp

Almskog, blandskog med ädellövinslag, Äl delar.

Närmast gården finner man en starkt igenväxt lövängsrest med grov hamlad alm. Mot norr vidtar en igenväxt ekhage med grov gran och starkt inslag av grov till mycket grov ek. Inslag av asp, björk, al, bok, ask och lönn. Gallring pågår. Enstaka mycket grova torrakor och lågor av ek och alm ingår.

Buskskikt av hassel med inslag av hägg och brakved. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lunglaven (*Lobaria pulmonaria*) förekommer spritt i området på ek, ask och lönn. På grov alm fanns *Biatorrella monasteriensis*, *Coniocybe pallida* och *Pseudoleskeella nervosa*.

Bedömning

Ovanlig skogstyp. Grova ädellövträd i äldre successionsstadier. Rik epifytflora.

Klass 2.

7226-1 Kullasand

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Medelgrov ek dominerar med mycket stort inslag av medelgrov björk och asp. Litet inslag av grov ask. Beståndet betas svagt. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av brakved, hassel och hägg. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp.

Fauna och flora

Enligt LFF förekommer lunglav (*Lobaria pulmonaria*).

Bedömning

Klass 3.

7226-2 Kulla, norra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov ek med inslag av medelgrov björk och asp.

Beståndet är röjt.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.

Areal (ha)	1,1
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-6
Virkesförråd	100
Ålder	G
Bonitet	S, M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Areal (ha)	13,4
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	S
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7226-3 Kulla, södra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Medelgrov till grov ekskog. Ett gallrat och tämligen glest bestånd. Litet inslag av björk.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk ristyp.

Fauna och flora

På ekarna finns rikligt med skägglaven *Usnea subfloridana* och lavarna *Arthonia vinosa*, *Pertusaria flavida*, *Chrysothrix candelaris* och *Chaenotheca trichialis*.

Areal (ha)	1,9
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	10-0-0-0
Virkesförråd	200
Ålder	G
Bonitet	S
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-, F

Bedömning

Klass 3.

7226-4 Torbjörnstorp

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

En medelgrov ekskog med inslag av medelgrov ask och björk. En liten bäck rinner genom beståndet. Skogen är gallrad.

Buskskiktet är tätt med hassel och har inslag av brakved och hägg. Fältskikt av frisk ört/ristyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,6
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	8-0-1-1
Virkesförråd	180
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7226-5 Torstorp, norra

Skogstyp

Ängsekskog AL.

Grov ek dominerar med inslag av medelgrov björk. Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp.

Fauna och flora

Lokal för blåsippan (A & E).

Areal (ha)	0,8
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	80
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-, F

Bedömning

Klass 3.

7226-6 Nabben

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En liten bäckravin ned mot Öresjö. Medelgrov till grov björk med stort inslag av al och bok. Inslag av klen lönn och ask samt grov ek. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet är glest med hassel, Fältskikt av frisk till fuktig örtyyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,0
Ädellövskog (%)	50
Trädslagsfördelning	1-3-1-5
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7226-7 Björkudden

Skogstyp

Björkskog.

Ett litet bestånd intill Öresjön. Medelgrov björk dominerar med mycket stort inslag av medelgrov al. Litet inslag av klen gran.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örtyyp och kruståteltyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,9
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-1-9
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	G

7226-8 Hallvik

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

En fuktig, kallpåverkad slänt. Medelgrov björk och ek med inslag av al och gran. Litet inslag av klen lönn. Beståndet är kraftigt gallrat.

Buskskikt av hassel med inslag av rönn. Fältskikt av frisk till fuktig örtyyp.

Areal (ha)	0,6
Ädellövskog (%)	40
Trädslagsfördelning	4-0-0-6
Virkesförråd	130
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	-
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7226-9 Lida

Skogstyp

Hedekskog, blandskog av trivialtyp, ÄL delar.

(9a) Medelgrov ekskog med inslag av gran, ask, al och lönn. Litet inslag av klen ädelgran (*Abies alba*). Beståndet, som är källpåverkat, är delvis gallrat.

(9b) Klen till medelgrov ekskog med inslag av ask och al. Beståndet är gallrat.

(9c) Klen till medelgrov björkskog med inslag av gran, al och ask. Beståndet är gallrat.

Buskskiktet domineras i alla delområden av hassel och brakved med inslag av hägg och viden. Fältskiktet är av frisk ört/ristyp och av frisk till fuktig örttyp.

Fauna och flora

I delområde förekommer blåsippa, skogsbingel och gulplister! På en ask i detta område hittades *Parmeliella triptophylla*. På ekarna förekommer *Arthonia vinosa*.

Bedömning

Klass 3.

7226-10 Fristad, norra

Skogstyp

Blandskog av triviallöv.

Medelgrov björk, asp och al samdominerar i detta bestånd. Enstaka boträd ingår.

Buskskikt av brakved, hägg och druvfläder.

Fältskikt av fuktig örttyp

Bedömning

Klass 3.

7226-11 L. Sölebo

Skogstyp

Askskog ÄL.

Bestånd 9a	
Areal (ha)	1,2
Ädellövskog (%)	60
Trädslagsfördelning	3-0-3-4
Virkesförråd	120
Ålder	U, M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bestånd 9b + 9c	
Areal (ha)	2,8
Ädellövskog (%)	3-0-3-4
Virkesförråd	60
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Areal (ha)	1,3
Ädellövskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	130
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Areal (ha)	1,1
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	0-0-10-0
Virkesförråd	-
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	D
Åtgärdsförslag	-

Medelgrovt till grovt ask med stort inslag av medelgrovt alm och klen lönn.

Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av högrörtyp.

Bedömning

Klass 3.

7226-12 Mölarps ö

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Klen till medelgrovt al, björk och ask. Litet inslag av alm. Beståndet ansluter till en slåtteräng i söder. Området är ett omtyckt utflyktsmål.

Buskskiktet är tätt med hägg, hassel, brakved och rönn. Fältskikt av frisk och fuktig örttyp.

Areal (ha)	1,9
Ädellövskog (%)	30
Trädslagsfördelning	0-0-3-7
Virkesförråd	120
Ålder	U, M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Fauna och flora

Enligt K-H Larsson växer här rikligt med skogsbingel och storrams.

Bedömning

Ovanlig skogstyp.

Klass 2

7226-13 Kröklings hage

Skogstyp

Hedekskog, askskog, blandskog med ädellövinslag, ÄL delar.

Ett varierat område med både torr, solöppen hagmark, bäckraviner, blockmark och bergväggar. Området är naturreservat. I söder finns en ekhage med grova träd. Längs bäcken och i nordsluttningen växer en blandskog med ek och inslag av grovt ask, lind, alm, björk, asp och gran. Litet inslag av klen lönn. Enstaka torrakor och lågor ingår.

Areal (ha)	10,3
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	5-0-3-2
Virkesförråd	-
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Buskskikt av hassel med inslag av brakved, rönn och hägg. Fältskikt av frisk ristyp och av torr, frisk och fuktig örttyp

Fauna och flora

Lokal för lundstjärnblomma, springkorn, skogsbingel, kransrams och skärmstarr. Enligt NÄ förekommer dessutom strutbräken, storrams, storgröe, myskmadra och hässleklocka.

Ekhagen i söder har en rik epifytflora med bl.a Usnea-arter, *Arthonia vinosa* och *Sphaerophorus globosus*. På grov ask och alm konstaterades *Leptogium saturninum*, *Coniocybe pallida*, *Pelti-gera praetextata*, *Homalia trichomanoides*, *Porella platyphylla*, *Antitrichia curtispindula* och *Neckera complanata*. På lövträdslågor förekommer *Herzogiella seligeri* och *Nowellia curvifolia*.

Äldre insamlingar finns av de sällsynta mossorna *Dicranum fulvum*, *Hylocomium brevistre* och dunfläta (*Hypnum callichroum*).

Bedömning

Mycket rik flora där hotade arter ingår. Bestånden har vissa naturskogsqualitéer.
Klass 1.

7226-14 Krökling, södra

Skogstyp

Blandskog med ädellövinslag.

Ett luckigt bestånd som domineras av medelgrov björk.
Inslag av medelgrov tall, gran, ek och al.

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståtel-
typ.

Areal (ha)	4,5
Ädellövskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-9
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Bedömning

Klass 3.

7226-15 Ekeslund

Skogstyp

Hedekskog, ekhage, ÄL.
Grov ek och ask.

Fauna och flora

Rikligt med skägglaven *Usnea subfloridana*. På ek-
stammarna påträffades *Chaenotheca chrysocephala*
och *Arthonia vinosa*.

Areal (ha)	8,4
Ädellövskog (%)	80
Trädslagsfördelning	8-0-0-2
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

Bedömning

Klass 3.

7226-16 Rölle - Aspared

Skogstyp

Ängsekskog, hedekskog, ÄL.

En nordvänd slänt med medelgrov till grov ekskog
med inslag av ask, björk och al. Området har tidigare

Areal (ha)	19,4
Ädellövskog (%)	100
Trädslagsfördelning	9-0-1-0
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

betats men växer nu igen. Enstaka lågor ingår.

Buskskikt av rönn, hassel och hägg. Fältskikt av frisk ört/ristyp och frisk (av skogsbingel-typ) till fuktig örttyp.

Fauna och flora

Lokal för skogsbingel.

Bedömning

En stor sammanhängande ädellövsskog med rik flora.
Klass 2.

7226-17 Alhem

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov al dominerar i denna slänt men inslaget av medelgrov björk är stort. Inslag av medelgrov gran och trädformig sälg. Litet inslag av klen ask. Beståndet är röjt.

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp.

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	8,3
Ädellövsskog (%)	0
Trädslagsfördelning	0-0-0-9
Virkesförråd	120
Ålder	M
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7226-18 Torstorp, södra

Skogstyp

Björkskog.

Grov till mycket grov björk dominerar med inslag av medelgrov ek. Beståndet är gallrat.

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp och krus-tåteltyp.

Fauna och flora

Lokal för blåsippan (A & E).

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	0,7
Ädellövsskog (%)	10
Trädslagsfördelning	1-0-0-9
Virkesförråd	150
Ålder	G
Bonitet	M, G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	-

7227-1 Lundhagen, norra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Areal (ha)	7,2
Ädellövsskog (%)	70
Trädslagsfördelning	7-0-0-0
Virkesförråd	250
Ålder	G
Bonitet	G
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

Medelgrov till grov ek med stort inslag av medelgrov till grov gran. Området är gallrat och innehåller sparsamt med lågor och torrakor. Söder om vägen finns rikligt med uppväxande sly. Buskskikt av brakved och rönn. Fältskikt av frisk ristyp och ört/ristyp.

Fauna och flora

Ekarna har en välutvecklad epifytflora med hänglavor och skorplaven *Lecanactis abietina*.

Bedömning

Välutvecklad ekskog med höga biologiska värden. Klass 2.

7227-2 Lundhagen, södra

Skogstyp

Alskog.

Medelgrov al med inslag av medelgrov björk och trädformig sälg. Litet inslag av klen gran. Beståndet betas svagt. Enstaka torrakor ingår. Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk och fuktig örtytp.

Bedömning

Klass 3

Areal (ha)	5,3
Ädellövskog (%)	0
Trädfördelning	0-0-0-10
Virkesförråd	140
Ålder	M
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G

7227-3 Fristad, östra

Skogstyp

Hedekskog ÄL.

Klena med enstaka grova ekar dominerar med inslag av klen björk. Beståndet är gallrat. Enstaka lågor ingår. Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp och kruståteltyp.

Fauna och flora

Stenknäck observerades (A & E).

Bedömning

Klass 3.

Areal (ha)	1,4
Ädellövskog (%)	90
Trädslagsfördelning	9-0-0-1
Virkesförråd	100
Ålder	U, G
Bonitet	M
Virkeskvalitet	N
Åtgärdsförslag	G