



Länstyrelsen Västra Götaland

Veterinär- och
djurskyddsenheten

Halmbrist – vad kan du göra?

Vissa år leder dåliga skördar till halmbrist. Om djurhållningen är beroende av halm som strömedel riskerar detta att leda till att djuren blir smutsigare än normalt. Då gäller det att vidta åtgärder som sänker halmåtgången. Här följer några tips på vad du kan göra:

På kort sikt – under kommande stallperiod:

- Strö dagligen
- Ställ inte in halmbalar i bädden som djuren själva får riva sönder, detta riskerar att leda till att ströet inte hamnar på de ställen som är i störst behov av strö.
- Utfodra inte i bädden utan vid ett foderbord.
- Om möjligt, gör en skrapgång vid foderbordet - då går det att minska gödseltrycket på bädden.
- Skrapa skrapgången dagligen - då drar djuren inte upp lika mycket gödsel i bädden.
- Flytta ut utfodringen om det finns hårdgjorda ytor utanför ladugården, gödselplatta eller motsvarande.
- Har du möjlighet att köpa annat strömedel så är det positivt att blanda in i ströbädden.
- Till grisar som behöver strömedel även som aktivering kan du t.ex. ha halm i halmhäckar så inte halmen blir smutsig och ratas för fort alternativt byta ut delar av halmen mot hö eller annat stråfoder.
- Anpassa utfodringen efter djurens näringsbehov. "Lösa magar" ökar belastningen på ströbädden. Ökad ts-halt i foderstaten och mera fibrer ger fastare gödsel.

På längre sikt – kommande stallperiod:

- Anlägg ströbädden så fort halmen är bärgad. Då är betongplattan fortfarande varm. Ett 50 cm tjockt lager är lämpligt att starta en ströbädd med.
- För att få igång bädden är det bra att blanda in gammal ströbäddsgödsel, ensilage eller hästgödsel.
- Bygg om till skrapgång med strödd liggyta och öka gärna bredden på skrapgången för att minska ströåtgången.
- Minska beläggningen - större ytor sänker halmåtgången.
- Åk på studiebesök och ta del av andra lantbrukares erfarenheter.