Diarienummer: 511-14643-2023
1267-212

Förslag till skötselplan för naturreservatet Allarps bjär

Höörs kommun



Länsstyrelsen Skåne




Fig.1. Den röda cirkeln anger naturreservatet Allarps bjärs ungefärliga läge.

Reviderad skötselplan

Fastställd:	[Klicka här och skriv]
Planförfattare:	Susanna Isberg
Diarienummer:	511-14643-2023
Omslagsbild:	Susanna Isberg
Foton:	Planförfattaren om inget annat anges

Innehåll

Skötselplan för naturreservatet Allarps bjär 1
Höörs kommun 1
Inledning 6
1. Syftet med naturreservatet 9
Syftet med naturreservatet 9
2. Beskrivning av området 11
2.1 Administrativa uppgifter 11
2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden 11
2.2.1 Geomorfologi och hydrologi 11
2.2.2 Historisk och nuvarande markanvändning och landskapsutveckling 12
2.2.3 Forn- och kulturmiljövård 12
2.2.4 Biologi och naturvärden 15
2.2.5 Vad kan påverka området negativt? 19
2.2.7 Övriga upplysningar 19
3.1. Information om Natura 2000 20
3.1.1. Naturtyper och arter enligt Natura 2000 21
3.1.1.1. Utpekade Natura 2000-livsmiljötyper och arter 21
Natura 2000-arter 22
Barbastell (*Barbastella barbastellus*, 1308) 22
Bechsteins fladdermus (*Myotis Bechsteinii*, 1323) 22
4 Övergripande mål och åtgärder 23
4.1 Övergripande mål 23
4.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder 23
4.3 Konsekvenser av klimatförändringar 24
4.4 Hydrologisk restaurering 24
5 Skötselområden med mål och åtgärder 24
Skötselområde – Naturskog ädellöv- och svämskog 26
Övergripande bevarandemål naturskog ädellöv- och svämskog 26
Hänsyn till rödlistade arter 27
Övriga rödlistade arter att ta hänsyn vid skötsel 27
Beskrivning 28
Bevarandemål 28
Arter 29
Skötselåtgärder 29
Beskrivning 29
Bevarandemål 30
Arter 30
Skötselåtgärder 30
Beskrivning 31
Bevarandemål 31
Arter 32
Skötselåtgärder 32

Bevarandemål 34
Arter 34
Beskrivning 34
Bevarandemål 35
Arter 35
Skötselåtgärder 35
6.1 Skötselområde – äng 37
Beskrivning 37
Bevarandemål 38
Arter 38
Skötselåtgärder 38
Beskrivning 39
Bevarandemål 39
Skötselåtgärder 40
Beskrivning 40
Bevarandemål 40
Skötselåtgärder 40
7 Jakt 41
8 Utmärkning av naturreservatets gränser 41
9 Tillsyn 41
10 Dokumentation och uppföljning 41
10.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder 41
Vegetationsuppföljning 41
Faunauppföljning 41
Barbastell och Bechsteins fladdermus 41
10.2 Revidering av skötselplanen 42
11 Kostnadsansvar och prioriteringar 42
12 Rödlistade arter 43
Diasemia reticularis 44
Perizoma hydrata 44
Ecliptopera capitata 44
Hepialus humuli 44
Barbastella barbastellus 45
Myotis nattereri 45
Eptesicus nilssonii 45
Myotis alcathoe 45
Plecotus auritus 45
13 Källor 44
13.1 Litteratur 46
13.2 Kartor 46
Bilagor 47
Bilaga C, Livsmiljötypskoder för kartan 50
Natura 2000-livsmiljötyper 50

Icke-livsmiljötyper 50

1. Skötselområdeskarta
2. Fornlämningar
3. Livsmiljötyper i kartan
4. Natura 2000-livsmiljötypskarta
5. Friluftskarta

Inledning

Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för hur och när dessa värden ska skötas. Bakom detta ligger syftena med bildandet av ett naturreservat. Syftet styr även vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i det dokument där bildandet av naturreservatet beslutas. Men, för att uppnå syftet med ett naturreservat kan det också krävas en särskild skötsel, vilken redovisas i detta dokument.

Naturreservatet Allarps bjär utgör även ett Natura 2000-område där bevarandeplanen reviderades 2016 därav är det inte en del i denna skötselplan, dock följer skötselplanen den fastställda bevarandeplanen.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda områden inom EU. Till varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan som består av en beskrivning av vilka livsmiljötyper och arter som finns inom Natura 2000-området, huruvida dessa har en fullgod bevarandestatus och vilken skötsel som behövs för att dessa naturvärden ska finnas kvar långsiktigt. Bevarandeplanen innehåller också en beskrivning av vilka verksamheter och åtgärder som kan hota de arter och livsmiljöer som ska skyddas inom Natura 2000-nätverket och används som underlag vid samråd och tillståndsprövningar av verksamheter och åtgärder inom Natura 2000-området. När skötselplan och bevarandeplan kombineras finns ingen separat bevarandeplan. I de fall där ny kunskap har tillkommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen när nästa tillfälle ges. Vid tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten förekommande livsmiljötyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanerna och skötselplanerna redovisar dessa med en symbol, även om de inte har hunnit beslutas av regeringen.

Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, dvs den som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte bara till förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter.

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsynen och uppföljning i statliga naturreservat. Förvaltningen kan överlåtas till andra, t ex en stiftelse eller den kommun där naturreservatet är beläget. De praktiska skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som förvaltaren har skötselavtal med.

Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bland annat naturreservatets syften och vilka natur- och bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för bevarandemålen och för hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftena.


1. Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet

Allarps berg är ett i terrängen markerat vulkanrestberg beläget i ett omväxlande mellanbygdslandskap. På sluttningarna finns huvudsakligen lövskog med en mycket rik flora av ängstyp. Den betingas av den speciella basaltberggrunden. Där denna övergår i annan berggrund sker en påtaglig och intressant förändring av vegetationen. Vissa partier med äldre tjockstammig ädellövskog skapar förutsättningar för en sällsynt fjärilsfauna. Området är även en viktig fågelbiotop. Några öppna inägor ligger insprängda i skogen. Tillsammans med omgivande landskap utgör området ett värdefullt och lätt tillgängligt exkursions- och strövområde, På grund av sina geologiska, botaniska och zoologiska naturvärden samt som ett viktigt inslag i landskapet bör Allarps berg avsättas som naturreservat.

Det övergripande syftet med Natura 2000-området Allarps Bjär är att bevara en ädellövsskog med naturskogsliknande karaktär med mycket död ved och gamla grova träd. De i området ingående Natura 2000-livsmiljötyperna och typiska arterna ska ha gynnsam bevarandestatus. De livsmiljötyper som finns är Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen (6270), Näringsrik bokskog (9130), Näringsrik ek eller ek-avenboksskog (9160), Ädellövskog i branter (9180) samt Svämlövskog (91E0 el. 9750).

Översiktskarta



Figur 2. Naturreservatet är markerat med punktstreckad linje på fastigheten.

2. Beskrivning av området

2.1 Administrativa uppgifter

Namn:	Allarps bjär
Kommun:	Höör
Natura 2000-ID:	Allarps Bjär SE0430179
NVR/DOS-ID[1]	2001486
Gränser:	Området är markerat med svart streckad linje på kartan på sidan 6
Berörda fastigheter:	Äsperöd 3:13 och delar av Äsperöd 2:5.
Markägarkategori:	Statlig och enskild ägo
Läge:	1 mil nordväst om Höör
Koordinat centralpunkt	E: 6206196.04 N: 401518.24 /SWEREF 99 TM
Inskrivna nyttjanderätter:	Finns i akten för beslut 11.1211-2180-78 1267-212
Gemensamhetsanläggningar:	Finns i akten för beslut 11.1211-2180-78 1267-212
Areal:	44 ha
Förvaltare:	Länsstyrelsen Skåne

2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden

Naturreservatet bildades den 13 mars 1984 och benämndes Allarps berg. Länsstyrelsen fastställde en skötselplan för naturreservatet Allarps bjär i Höörs kommun 1989-06-20. 2005 blev området även klassat som Natura 2000 och en bevarandeplan fastställdes och kungjordes av Länsstyrelsen 2014-05-23, 2016-12-16 samt 2016-12-30. Detta är en reviderad skötselplan som utgår från den gamla, men som anpassats efter nuvarande skötsel och bevarandemål. Det är inte en kombiplan med N2000 utan bevarandeplanen från 2016 gäller fortsatt.

2.2.1 Geomorfologi och hydrologi

Allarps bjär reser sig markant över den relativt flacka omgivningen. Den utgörs av en gammal vulkanbergrest, en basaltkupp med en högsta höjd av ca 120 m. ö h. Förenklat är det lavan som aldrig välde ut ur vulkanen, utan den så kallade magman som blev kvar i kraterrör och öppning när vulkanen svalnade. Under årmiljonernas lopp har allt förstenats och vulkanens yttre eroderats bort. Typiskt för basalten är att den spricker upp i fem- eller sexkantiga pelare, s.k. pelarförklyftning. Detta beror på att lavan krymper när den stelnar och svalnar. Basaltkuppen är bevuxen med gammal grovstammig ädellövskog med små inägor insprängda i området och fuktig ädellövskog i svackorna nedanför berget. Basalt är en näringsrik bergart, något som märks tydligt

på den rika växtligheten. Kvar finns bara den hårda kärnan av basalt. Omgivande landskap är åkrar, betesmarker och produktiv ädellövskog som ligger i ett omväxlande mellanbygdslandskap. Basalten är rik på basiska och näringsrika mineraler vilket också visar sig i en örtrik flora. Jordarterna domineras av grovmo, sand och grus.

Området utgör en utmärkt fladdermuslokal med 15 av Sveriges 19 olika fladdermusarter. Äldre grovstammig ädellövskog skapar förutsättningar för en mindre vanlig fjärilsfauna, arter utpekade i den tidigare skötselplanen är dock inte återfunna de senaste 20 åren. Området är även en viktig fågelbiotop. Tillsammans med omgivande landskap utgör området även ett värdefullt och lätt tillgängligt exkursions-och strövområde.

2.2.2 Historisk och nuvarande markanvändning och landskapsutveckling

Allarps bjär är belägen i skogsbygd och har därför präglats av ett från äldre tider härstammande omväxlande och mosaikartat odlingslandskap. På den geometriska kartan för Äsperöd, Allarp och Norra Hultarp från 1719 beskrivs Allarps Bjär som ”bergig mark med gammalt böke på” alltså med gammal bokskog. Vid gränsen till Södra Hultarp fanns en ängsmark som utmynnar till en större äng där åkermarken finns idag. På Laga skiftetskartan från 1831-33 visas att området då i stort hade en likartad struktur som idag. Vissa av dagens ängsmarker tycks ha varit något fuktigare under 1800-talet och har troligen blivit föremål för viss dränering. På den gamla ekonomiska kartan från 1917 utgörs området mestadels av lövskog men det som idag är svämlövskog brukades då som sidvallsäng och i angränsningen till Södra Hultarps reservat fanns våtmarker i form av mosse, myr eller kärr. Åkrarna har nästan identisk form och läge som idag. Betesmarken uppe på berget var tidigare en liten hårdvallsäng. Dagens ängsmarksvegetation (livsmiljötypen silikatgräsmarkern, 6270) var däremot markerat som lövskog år 1917. På flygfotot från 1940-talet såg området ut precis som idag med undantaget att åkern i sydost var lite större. Denna del är skog idag.

Toppen av Allarps berg var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ganska öppen och där växte orkidéer och smörbollar, vid sekelskiftet erbjöd det öppnare landskapet en vidsträckt utsikt från Allarps berg. Det har berättats (Jerslind muntligen) att det förr i tiden betraktades som något av ett folknöje att från Allarps berg betrakta militärövningar som ägde rum vid Ljungbyhed vid Söderåsen. Fri utsikt gavs även mot Hallaröds kyrka. Toppen utnyttjades även som en dansbana.

2.2.3 Forn- och kulturmiljövård

Inom reservatet finns 15 registrerade fornlämningar som vittnar om människans närvaro under mycket lång tid. Det är hålvägar, fossila åkrar, stenmurar, torpgrunder och så den berömda Karrastenen. Det är en basaltsten ca 30 cm i diameter som benämnes "Karra stenen", eftersom det påstås att det i gångna tider har ansetts som ett

mandomsprov bland männen i trakten att kunna lyfta stenen. Stenen är i dag utmärkt med en minnesskylt. Kanske försökte man lyfta stenen på vägen hem efter en dans-kväll uppepå berget?



Bild 1 Karrastenen Foto: Kristian Nilsson

Tabell 1. Tabellen visar en översikt av fornlämningar i området, deras benämning (lämningsnummer) enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ), typ av fornlämning samt i vilket skötselområde de är lokaliserade.

Lämningsnummer	**Typ av fornlämning**	**Skötselområde**
L1986:3658	Fossil åker	Näringsrik ek-avenbokskog Nordlig ädellövskog
L1986:3689	Stenmur	Näringsrik bokskog
L1986:3690	Stenmur	Ädellövskog i branter
L1986:3692	Hålväg	Näringsrik bokskog
L1986:3749	Fossil åker	Näringsrik bokskog
L1986:3785	Husgrund	Näringsrik bokskog
L1986:3787	Stenmur	Näringsrik bokskog
L1986:3788	Fossil åker	Näringsrik bokskog Nordlig ädellövsskog
L1986:3789	Stenmur	Näringsrik bokskog
L1986:3922	Husgrund	Näringsrik bokskog
L1986:4107	Fossil åker	Näringsrik bokskog
L1989:2593	Naturföremål, Karrastenen	Näringsrik bokskog
L1989:2654	Fossil åker	Näringsrik bokskog
L1989:2672	Hålväg	Näringsrik bokskog

Fornlämningarnas lokalisering framgår av bilaga B.

Vid röjningar ska inte röjningsmaterial ligga kvar nära eller på fornlämningar. Vid anläggande av stig eller liknande ska hänsyn tas till fornlämningarna, så att fornlämningarna inte skadas av slitage. Eldning får heller aldrig ske i närheten av fornlämningar då

det kan ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Fornlämningar får heller inte skadas i samband med avverkning och utkörning av virke. I områden med registrerade fornlämningar ska samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ske innan åtgärd utförs.

2.2.4 Biologi och naturvärden

Allarps bjär består av ädellövskog och fuktigare skogar främst av med bok, ek, avenbok, fågelbär, lönn, ask och lind medan sluttningarna täcks av bok- och avenbokskog, ibland med inslag av ek och lind. Lönn kommer upp rikligt på sina ställen. Skogen är präglad av att inga större ingrepp gjort så att ett naturskogsliknande tillstånd bildats med mycket död ved och en del gamla grova träd. Avenbok förekommer speciellt rikligt på basaltkuppens sluttningar.

Skogen på Allarps bjär har en lång kontinuitet som lövbärande mark vilket har skapat goda förutsättningar för en hög biologisk mångfald med höga naturvärden. Den långa skogliga kontinuiteten och den goda tillgången på död ved har lett till en rik miljö för lavar, mossor och svampar. Asken och almen som i tidigare skötselplan utpekats som framtida dominerande trädslag har i princip helt slagits ut av almsjuka och på senare år askskottsjukan. Nu kommer istället mycket lönn, som är ett ganska ljuskrävande träd har sannolikt etablerat sig innan skogen på toppen fått den slutna karaktär den har idag. Föryngringen av lönn är synnerligen god. Bara de senaste åren har i princip hela toppen blivit helt kal vilket kan påverka lundfloran. Dock ska nämnas att på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var toppen kal med en fin ängsflora.

Inom området finns små inägor av bete och slåttermark samt områden med fuktstråk främst av al-ekskog. Tidigare ängar som under en period varit granskog och sedan vall ska nu åter igen få bli äng med slåtter eller bete.

Antalet rödlistade arter är hög inom området, närmare 40 st, en nyare inventering är inte gjord utan baseras endast på inrapporteringar i Artportalen. Inom området har 15 olika fladdermusarter observerats, bl.a. barbastell (NT), brunlångöra (NT), nymffladdermus (NT), nordfladdermus (EN). På våren blommar blåsippa, gulsippa, hålnunneört, skånsk nunneört, sankt Pers nycklar, sårläka, gullviva, ramslök och inte minst mattor av vitsippor. Lite senare ersätts den prunkande vårfloran av till exempel skogsbingel, myskmadra, gulplister, humleblomster och aklejruta. Bland kärlväxter är hålnunneörten (NT) och ramslöken kanske de som utmärker sig mest med stora bestånd på hela basaltkuppens topp och sluttningar. Området hyser ett flertal rödlistade svampar, bl. a kortfotkremla (NT), koralltaggsvamp (NT), skarp rökriska (NT), skönkremla (VU) och oxtungsvamp (NT). Den näringsrika vulkaniska berggrunden skapar förutsättningar för en rik svampflora med många intressanta och ovanliga arter, däribland cinnoberspindling, dystersopp, fjällsopp och elfenbensvaxing, gulmjölkig storskål, riskorna *Lactarius fluens* och *Lactarius ruginosus*.

Lavfloran hyser bl.a. klosterlav (NT), lunglav (NT), bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT), askvårtlav, violettgrå porlav och rosa lundlav. Fjärilar som noterats är, gulryggig fältmätare (VU), ligusterfly, humlerotfjäril (NT), bokstavsmott (VU), glimfältmätare (NT). Sannolikt finns fler arter då en inventering inte är gjord. De två sistnämnda arterna hör till mer ängsvegetation som fanns tidigare på toppen, det är troligt att de inte finns kvar.

Tidigare noterade och utpekade ovanliga arter som förgyllt metallfly (*Polychrysia c-aureum*) och piltecknad fältmätare (*Cidaria sagittata*), vars larver lever på aklejruta, samt vassspetsad sickelvinge (*Drepana harpagula*) och lindmalmätare (*Eupithecia egenaria*), vars larver lever på lind är inte noterade de senaste 20 åren.

Många av lövskogens fåglar finns i området, vår och försommar kan grönsångare, svart flugsnappare, rödstjärt och skogsduva höras.

Beskrivning av biogeografisk uppföljning fladdermöss 2016-2021

Totalt uppgick antalet registrerade fladdermusarter till minst 9 under inventeringsperioden 2021. Dominerande arter utgjordes av dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus (35,8 %) och mustasch-/tajgafladdermus Myotis mystacinus/M. brandtii (14,2 %). Inom området noterades följande rödlistade arter: fransfladdermus (NT), nordfladdermus (NT), barbastell (NT) o0ch brunlångöra (NT). Barbastellens återkomst sedan 2016 är glädjande. Sociala interaktioner noterades vilket kan indikera förekomst av en mindre koloni inom inventeringsområdet.

Antal registreringar är ett mått på aktiviteten hos fladdermössen i det aktuella området. I jämförelse med antalet registreringar under tidigare inventeringsår har antalet fortsatt att minska. Den faktor som har störst påverkan på fladdermössens aktivitet är troligen tillgången på insekter.

Tabell 2. Procentuell andel av totala antalet registreringar av fladdermöss inom Allarps bjär, Höörs kommun, åren 2016 2018 och 2020 samt totala antalet registreringar.

År	Mdau %	Ppyg %	Pnat %	Antalet registreringar
2016	22,6	24,1	22,7	957
2018	37,5	12,6	1,7	833
2020	17,4	30,3	2,5	869

Beskrivning av fältskiktets växtsamhällen

1981 gjordes en inventering av Allarps bjär gällande landskapsbild, geologi samt floran och faunans strukturer. Detta finns redovisat i meddelande Allarps berg, 1981:3. Inför denna revidering har en ny inventering gjorts i syfte att jämföra vad som hänt i trädslagsblandning och fältflorans utbredning och artsammansättning under drygt 40 år. Resultatet visar på att det skett en stor förändring under dessa år.

Inventeringen utfördes under sista veckan i juli och de två första veckorna i augusti 2023. Försommaren var mycket torr, juni månad var extremvarm för att sedan slå om och vara extremt regnigt under juli och augusti. Inventerare var Joakim Kronvall, praktikant från Hvilan utbildning.

1981 fanns det 41st kärlväxtarter inom storrutorna och 33 st inom bandprofilen med sommarvegetation. 2023 inventerades 41 kärlväxtarter inom storrutorna och 22 inom bandprofilen. Storrutornas artsammansättning hade på stora delar förändras mycket då 16 st ej återfanns och 16 st nya etablerat sig. Gällande bandprofilen saknades 14 st och 4 st nya arter hade etablerats. Den exakta positionen är något osäker då inga koordinater fanns från inventeringen 1981, endast en kartskiss.

Ur meddelande 3:981 går att utläsa följande;

”Vegetationsgradienterna på Allarps bergs sydsluttning har belysts med en bandprofil vilken även visar hur de olika växtsamhällena är beroende av olika edafiska och lokalklimatiska faktorer.

Ljustillgången är störst inom de övre delarna av profilen och avtar nedåt. På toppen dominerar tex hässlebrodd, lundslok, skogsbingel och gulplister. Enstaka exemplar förekommer av löktrav, skogsvicker och stinknäva.”

Inventeringen 2023 visade bl.a. att hässlebrodd som dominerade 1981 i provrutorna helt hade utgått från dessa (finns i området på andra ställen). Vidare hade även skogsvicker, kärrgröe, storrams, underviol, tandrot, mysk, lind, rönn, skogsviol, liljekonvalj, teveronika och ramslök inte återinventerats i provrutorna. Ramslök finns det mycket av i området så en del av förändringen kan vara skillnader i inventeringstidpunkt och att vissa arter hunnit försvinna för säsongen. Nytillkomna är storrams, myskmadra, getrams och buskstjärnblomma.

Arter som ej påträffats 2023 inom storrutorna är aklejruta, skogsfräken, ekbräken, skogsbräken, tuvtåtel, hundäxing, skogsnarv, underviol, skogsviol, myska, hundloka, toppdån, snärjmåra, vildkaprifol, hässleklocka, gullris och ramslök. Ramslök finns rikligt i området men p.g.a. annan tidpunkt återfanns den inte. Antalet provrutor är inte tillräckliga i antal för att kunna säga något om arterna försvunnit från området, men kanske om hur frekventa de är. Arter som kraftigt minskat är lundgröe, skogsbingel, blåsippa, lungört och kirskål. Arter som ökat är lundarv, stinknäva och lundslok. Nya

arter är myskmadra, löktrav, lundviol, avenbok, getrams, harkål, maskros, dvärghäxört, vicker, pipdån, ek, rönn, starr, skogsstjärna och stensöta.

Jämförelse av utbredning av växtsamhällen

1981 var tämligen stora områden på den mest näringsrika marken på de två topparna täckta med en riklig förekomst av skogsbingel. 2023 finns skogsbingel fortfarande kvar men återfinns inte i samma omfattning, den saknas helt i tre storrutor där det tidigare fanns väldigt mycket. Blåsippa fanns i stora mängder men har kraftigt minskat.

På områden med hög markfuktighet dominerade ramslök under våren, det gör den fortfarande. Dessa områden återfinns sedan under sommaren som nästan vegetationsfria fläckar i terrängen. Speciellt våraspekten är fortfarande iögonfallande med sin rikliga förekomst av vitsippa, gulsippa, svalört, gulplister och skånsk nunneört. Andra vår- och försommararter som tidigare fanns var skogsstarr, vispstarr, storrams, kransrams, buskstjärnblomma, blåsippa, smånunneört, aklejruta, löktrav, tandrot, vårärt, stinknäva, underviol, vätteros och myska. Aklejruta, myska, underviol, vätteros, löktrav och tandrot återfanns ej vid inventeringen 2023, delvis kanske p.g.a tidpunkten för inventering. Aklejruta har inte rapporterats in i artportalen så den kan ha utgått. Även om den skulle ha blommat ut borde blad ha återfunnits.

På sommaren är gräsinslaget mera markant och de för lundar typiska arterna hässlebrodd, lundslok och lundgröe bredde ut sig över stora områden. Under sommaren påträffades även andra örter som t ex lundarv, nejlikrot, kirskål, snärjmåra och hässleklocka. Inslaget av träjon var och är stort. Snärjmåra och hässleklocka hittades inte vid inventeringen 2023 medan lundarv ökat markant.

Sammanfattningsvis så 2023 återinventeras inte skogsfräken, aklejruta, ekbräken, skogsbräken, tuvtåtel, hundäxing, skogsnarv, underviol, skogsviol, myska, hundsloka, toppdån, snärjmåra, vildkaprifol, hässlebrodd, gullris och ramslök. Den senaste pga hunnit vissna ner för säsong. Lundslok hade 2023 ökat markant i utbredning likaså lundarv. Lundgröe hade kraftigt minskat och återfanns endast i en storruta men få plantor, blåsippa likaså kraftigt minskat, snärjmåra och hässleklocka hade helt försvunnit i provrutorna.

Inom stora delar av reservatet är och var gulplister en vanligt förekommande art tillsammans med lundarv. Förekomsten av myskmadra var dominerande kring vulkankäglans sluttningar, den påträffades inte alls vid inventeringen 2023. Lundslok både hade och har en vidare utbredning och förekommer sommartid rikligt i näringsrika partier. Slutsatsen är att några ljuskrävande arter såsom aklejruta har försvunnit och skogsbingel har minskat och är inte längre dominerande. Från studier i Dalby söderskog så har det visat sig att mördarsnigeln i princip utrotat skogsbingel, kanske kan samma sak skett här?

Det större kärrområdet i öster utgöres av en fuktlövskog med ett frodigt och artrikt fältskikt med ett stort inslag av skogsfräken, majbräken, vänderot och kärrfibbla på de fuktigaste partierna. Av övriga arter kan nämnas tuvtåtel, kärrgröe, kabbleka, aklejruta, gullpudra, skogsbingel, kirskål och På mindre fuktiga partier i utkanterna finner andra arter sin ståndort, bl.a. skärmstarr, ormbär, grönvit nattviol, ekorrbär, majsmörblomma och hallon.

De f.d. vallarna visade efter endast en säsong över 30 blommande arter av vanlig karaktär, exempelvis rölleka, liten blåklocka, humleblomster och brunört.

2.2.5 Vad kan påverka området negativt?

- Förändringar i områdets hydrologi från både inom och utanför området genom t.ex. markavvattning. Förändrad vattenkemi och försämring av vattenkvalitén genom t.ex. utsläpp av föroreningar och gifter i vattendraget, försurning eller eutrofiering. Rensning, dikning, muddring eller breddning av vattendraget.
- Nedfall av luftföroreningar.
- Tillförsel av främmande giftiga eller reproduktionsstörande ämnen så som tungmetaller och hormoner.
- Användning av bekämpningsmedel och kemikalier inom området och i de närliggande skogarna och åkrarna.
- Införsel av främmande eller invasiva arter.
- Brist på föryngring av ersättningsträd till gamla och grova träd.
- Avverkning av grova träd, senvuxna träd, socklar, hålträd, döda eller döende träd inom området eller i omkringliggande områden. Borttagning och bortforsling av markliggande död ved.
- Igenväxning som minskar hålträdens livslängd och hindrar rekrytering av nya hålträd, vilket leder till kontinuitetsbrott.
- Ett förändrat klimat kan leda till att förutsättningarna för bevarande ändras snabbare än beräknat. Detta leder till att man måste revidera skötseln med kortare intervall för att följa klimatets utveckling och de senaste forskningsresultaten.
- Sjukdomar på ädellövträd som t.ex. almsjukan och askskottssjukan. De påverkar ljusförhållandena när träd dör.

2.2.7 Övriga upplysningar

Naturreservatet har mycket höga naturvärden. Allarps bjär har angivits som skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt avseende på regional och kommunal nivå och omfattas eller ingår i:

- Riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB naturvård: Området ligger inom riksintresse för naturvården, Allarp – Äsperöd nr 34.

- Rödlistade arter: Artdatabanken har (2023) klassat 38 st rödlistade arter inom området, dock ej inventerat.
- Åtgärdsprogram för hotade arter: I området finns barbastell (Barbastella barbastellus) (NT). Naturvårdsverket har tagit fram ett specifikt åtgärdsprogram för dess bevarande.
- Länets naturvårdsprogram: Området ingår i Höörs naturvårdsprogram, fastställd 2012 med naturvärdesklass 1.
- Grön infrastruktur: Området gränsar till naturreservatet Södra Hultarp, ligger ca 1 km från Hallaröds naturreservat och ca 3 km från naturreservatet Eneskogen, 4 km från naturreservaten Bjäret och Dagstorp.
- Ängs- och betesmarksinventeringen: Området är upptaget inom ängs- och betesmarksinventeringen.
- Skånes Landskapsbildsskydd

3.1. Information om Natura 2000

I samband med inträdet i Europeiska Unionen har Sverige accepterat att delta i arbetet med att etablera ett nätverk av skyddade områden i Europa kallat Natura 2000. Nätverket byggs upp av områden som föreslås av regeringen och som antas av EU-kommissionen i enlighet med två direktiv inom naturvårdsområdet, EU-rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG (habitatdirektivet) och EU-rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) inklusive direktivens uppdateringar.

Direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda arter och deras livsmiljöer i Europa. EU-direktiven bygger på nya kunskaper och inför principen att bevara livsmiljötyper för deras egen skull och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. Habitat- och fågeldirektivet är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992.

Sverige har ett särskilt ansvar för att skydda och vårda de områden som är föreslagna att ingå eller som ingår i Natura 2000 och detta regleras i den svenska lagstiftningen i Miljöbalken med tillhörande Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt

miljöbalken med mera Det innebär att åtgärder som kan inverka negativt på bevarandestatus för preciserade habitat eller arter inom naturreservatet kräver samråd och i vissa fall tillstånd enligt miljöbalken med tillhörande förordningar.

3.1.1. Naturtyper och arter enligt Natura 2000

3.1.1.1. Utpekade Natura 2000-livsmiljötyper och arter

Nedan finner man naturtyper och arter som är utpekade för N2000- området Allarps bjär enligt fastställd bevarandeplan 2016-12.

Tabell 1a-d. Allarps Bjärs livsmiljötyper med arealer 2023 och Natura 2000-arter. Natura 2000-koder inom parentes. Livsmiljötyperna indelas i fullgod bevarandestatus där alla kriterierna för areal, ekologisk struktur och funktion samt för typiska arter är uppfyllda. I en icke fullgod livsmiljötyp uppfylls definitionen för livsmiljötyp men det kan saknas delar av ekologisk struktur och funktion eller typiska arter. Utvecklingsmarker kan inte definieras som en livsmiljötyp idag men kan omföras till någon livsmiljötyp med aktiva åtgärder eller med naturlig förändring efter lång tid. * (asterisk) betyder prioriterad livsmiljötyp enligt Natura 2000. ♦ (romb) betyder ny art/livsmiljötyp som inte är beslutad av Regeringen.

Livsmiljötyp	**Fullgod bevarandestatus (ha)**	**Icke fullgod bevarandestatus (ha)**	**Total areal (ha)**
*Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen (6270)	0	1,1	1,1
♦Nordlig ädellövskog (9020)	7,5	0	7,5
Näringsrik bokskog (9130)	24,5	0	24,5
Näringsrik ek eller ek-avenboksskog (9160)	0,41	0	0,41
*Ädellövskog i branter (9180)	3,2	0	3,2
*Svämlövskog (91E0 el. 9750)	1,5	0	1,5

Utvecklingsmark	**Areal (ha)**
Icke natura skog (9900) som utvecklas mot näringsrik bokskog (9130)	0,64

Markklass	**Areal (hektar)**
Total areal livsmiljötyper	38,2
Total areal utvecklingsmark	0,64
Total områdesareal	38,8

Natura 2000-arter	**Bevarandestatus**
Barbastell – *Barbastella barbastellus* (1308)	Icke fullgod
Bechsteins fladdermus - *Myotis bechsteinii* (1323)	Icke fullgod

Habitatens utbredning finns även redovisade på karta, se bilaga D.

Det förekommer ett flertal arter inom naturreservatet som är rödlistade enligt artdatabankens rödlista över hotade arter, se kapitel 12.

Till Natura 2000-området togs en bevarandeplan fram 2016, vilken har beaktats i samband med skötselplanearbetet.

Natura 2000-arter

Barbastell (*Barbastella barbastellus*, 1308)

Barbastellen är en fladdermus som vanligtvis påträffas i gamla kulturlandskap i form av byar med flera tätt närliggande gårdar och ladugårdar, men i Skåne är arten mer knuten till gamla bokbestånd för födosök, yngelkolonier och dygnsvila. Den kan också finna kolonimiljöer som karaktäriseras av naturbetesmarker och ängar, ofta med god tillgång på grova lövträd. En viktig jaktbiotop utgörs av trädgårdar av äldre typ som inte är allt för intensivt skötta, och öppna kärr och översilningsmarker är också vanliga biotoper för arten. Arten jagar ofta nära kolonierna, men kan ibland flyga långa sträckor för jakt i skogar eller naturbetesmarker. Flera undersökningar visar att arten regelbundet kan flyga minst 4 km ut i omgivningarna vid jakt. Arten är speciellt inriktad på att äta fjärilar, inte minst småfjärilar, men tar även andra smådjursgrupper, så som t.ex. tvåvingar och spindlar. Från år 2000 till 2015 bedömdes barbastell som EN (Starkt hotad) men klassades därefter om till VU (Sårbar). I den senaste rödlistan från 2020 är arten klassad som NT (Nära hotad). Artens 33 utbredning i Europa minskar dock fortfarande. Den svenska populationen uppskattas till 2000– 3000 vuxna djur. Arten har expanderat i Skåne och Halland sedan slutet av 1990-talet.

Arten har observerats i Allarps bjär under sommarhalvåret när den födosöker efter insekter och arten har i Natura 2000-området en icke fullgod bevarandestatus.

Bechsteins fladdermus (*Myotis Bechsteinii*, 1323)

Bechsteins fladdermusen är en medelstor fladdermus med långa öron som i Sverige bara hittats på ett fåtal platser i Skåne. I Norden finns den också på Bornholm. Artens dagtillhåll är i hålträd och de övervintrar i grottor, håliga träd, gruvor och klippspringor. De kräver gammal, ofta mager naturlövskog med bok, ek, avenbok m.fl. trädarter och med små naturliga gläntor. Förekomst av hackspetthål är en viktig resurs för arten, men den kan också använda fågelholkar för kolonier eller viloplatser. Arten är mycket sällsynt och lever i skog med lång kontinuitet. Arten är rödlistad som akut hotad (CR).

Bechsteins fladdermus är stationär och rör sig inte över stora avstånd. De är bundna till skog för sitt födosök men de kan även röra sig över öppen mark. Furageringsområdena för enskilda individer är oftast inte större än cirka 10 ha. Avstånd mellan koloniträd och födosöksområde är sällan över 1000 m. De kan flyga över öppen mark till och

från jaktbiotoper men är i stort bundna till skog för födosök. Till ca 85% består deras bytesdjur av icke-flygande insekter som tvestjärtar, spindlar, lockespindlar, dubbelfotingar och fjärilslarver.

Arten missgynnas när skog med lång kontinuitet avverkas och deras jaktbiotoper samt viktiga hålträd försvinner. Den skånska populationen är helt isolerad från bestånden på kontinenten och kan mycket väl ha funnits i Skåne i tusentals år. Populationsstorleken är okänd men antas vara färre än 50 adulta individer.

Utbredningsområdet för sommarfynd har troligen minskat till mindre än hälften av det tidigare kända. Huvuddelen av artens population finns nu inskränkt till Göingebygden. Vid ArtDatabankens bedömning för rödlistningen 2025 är Bechsteins fladdermus klassad som akut hotad (CR) och anses vara Sveriges mest hotade däggdjur.

Bechsteins fladdermus är störningskänslig på övervintringsplatserna bl.a. på grund av vanan att hänga fritt i taket. Grova träd i omgivningarna bör sparas i möjligaste mån.

Arten har observerats i Allarps bjär under sommarhalvåret när den födosöker efter insekter och arten har i Natura 2000-området en icke fullgod bevarandestatus.

4 Övergripande mål och åtgärder

4.1 Övergripande mål

Bevarandemålen är långsiktiga och det som gäller när området har gynnsam bevarandestatus. Det är viktigt att påpeka att de måste revideras allt eftersom ny kunskap kommer fram.

Ett övergripande bevarandemål för typiska arter i området är:

- Artrikedomen och arttätheten i områdets befintliga habitat ska bevaras och utvecklas.
- Förekomsten av rödlistade växt-, svamp- och djurarter, som är knutna till området, ska bevaras och utvecklas, så att de kan föryngra sig i långsiktigt livskraftiga populationer.

Området ska, inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer, bevara och utveckla upplevelsevärdena i ett välbesökt naturområde som har stor betydelse som ett friluft- och rekreationsområde.

4.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder

- Skapa mer död och döende lövved.
- Vidta åtgärder för att stärka hotade arter.

4.3 Konsekvenser av klimatförändringar

Den prognostiserade ökade nederbördsmängden (15%) framförallt vintertid, kan komma att gynna utvecklingen i lövsumpskogarna i området. De befarade torrare somrarna kan dock motverka denna utveckling. Ädellövskogen kan komma att gynnas genom ett varmare klimat, men träd och fältskikt kan likväl drabbas av omfattande torkskador med artförsvinnande som följd. Ett varmare klimat kommer att gynna spridning av invasiva arter till naturreservatet som slår ut den inhemska floran och faunan.

Klimatförändringar kan påverka områdets värden och skötsel negativt genom:

- Ökad igenväxningstakt i naturbetesmarker och våtmarker.
- Problem för betesdjuren med långvarig hetta och torka, samt med sjukdomar och andra svårigheter p.g.a. för blöt mark.
- Ökad mängd trädsjukdomar, svamp och insektsangrepp på lövträd och skyddsvärda träd.
- Ökning av främmande arter samt invasiva arter som kan konkurrera ut skyddsvärd flora och fauna både på land och i vattnet.
- Snabbare förfall av friluftsanordningar.

Tänkbara skötselåtgärder för att komma till rätta med eventuella problem orsakade

av klimatförändringar:

- Igenväxning: röjning, slåtter, bränning, förlängd betessäsong, fler betesdjur, efterbete.
- Förlust av habitat
- Problem för betesdjur: säkrad dricksvattenförsörjning, solskydd, betesplanering/fållindelning, härdiga raser, kompletterande skötsel (röjning, slåtter, bränning).
- Trädsjukdomar: gynnande och nyplantering av efterträdare, fler trädslag (inhemska och resistenta sorter), handlingsplan för eventuell smitta, veteranisering (skapa gammelträdskvaliteter genom specifik skötsel av yngre träd).
- Främmande arter: gynnande av inhemska arter, bekämpning av oönskade arter.
- Friluftsanordningar: användning av tåliga material, täta kontroller och underhåll.

4.4 Hydrologisk restaurering

I området finns några diken, mer eller mindre vattenförande beroende av nederbördsmängd och årstid. Förvaltaren får efter utredning, lägga igen diken inom naturreservatet som ej påverkar utanför naturreservatet liggande mark.

5 Skötselområden med mål och åtgärder

Naturreservatet har delats in i tre olika skötselområden med delområden.

- Skötselområde Naturskog ädellöv- och svämskog
- Skötselområde Äng
- Skötselområde Friluftsliv

Skötselområde – Naturskog ädellöv- och svämskog

Delområde 5.1.1: Ädellövskog i branter, 9180, 3,2 ha

Delområde 5.1.2: Näringsrik bokskog, 9130, 24,5 ha

Delområde 5.1.3: Näringsrik ek- eller ek/avenbokskog, 9160, 0,41 ha

Delområde 5.1.4: Nordlig ädellövskog, 9020, 7,5 ha

Delområde 5.1.5: Svämlövskog, 91E0, 1,5 ha

Areal totalt: 38,2 ha

Övergripande bevarandemål naturskog ädellöv- och svämskog

- Död ved i olika dimensioner och i olika nedbrytningsstadier sparas och forslas inte bort från området.
- Grov död ved (grövre än 50 cm i diameter) skall finnas kontinuerligt i form av lågor, torrakor, döda, stående träd, träd med döda grenar och högstubbar och volymen död ved ska i genomsnitt uppgå till minst 40 m3/hektar för att området ska kunna upprätthålla långsiktigt livskraftiga populationer av flera rödlistade arter.
- Antalet ädellövsträd med en minimiålder på 150 år uppgår till mer än 7 st/ha. De gamla träden ska omfatta både grova träd och tunna senvuxna träd.
- Olikåldrighet i bestånden eftersträvas.
- I ädellövskogen i branter (9180) och bokskogen ska nyckelarterna i trädskikten finnas i minst två skikt. I alla skikt skall nyckelarterna utgöra minst 50 % av skiktet. Nyckelarter i 9180 är bok lind, lönn och ask. Bok utgör nyckelart i bokskogshabitaten (9110, 9130).
- Skogarnas betydelse för naturupplevelser och friluftsliv ska tas till vara.
- Skogen får utvecklas i huvudsak utan större ingrepp. Produktionsskogsbruk får ej förekomma. Naturvårdsåtgärder såsom borttagande av granföryngring, försiktigt friställande av äldre värdefulla träd samt åtgärder som gynnar föryngring kan dock ske. Äldre träd och grova träd bevaras. Flerskikthet eftersträvas.
- Typiska arter som bokkantlav, bokvårtlav, rosa lundlav, myskmadra, plattfjädermossa, guldlocksmossa, lunglav och buskstjärnblomma ska finnas i ädellövskogen.
- I svämlövskogen (91E0) så måste hydrologin vara ostörd och översvämningar ska ske regelbundet. Socklar ska bevaras. Typiska arter som strutbräken och bäckbräsma ska finnas i de fuktigare skogarna. Betesmarken ska hållas öppen.

Hänsyn till rödlistade arter

I den gamla tidigare skötselplanen anges att biotopen för bl.a. de mindre vanliga fjärilsarterna förgyllt metallfly (*Polychrysia c-aureum*) och piltecknad fältmätare (*Cidaria sagittata*), vars larver lever på aklejruta, samt vasspetsad sickelvinge (*Drepana harpagula*) och lindmalmätare (*Eupithecia egenaria*) , vars larver lever på lind, ska restaureras och vidmakthållas genom enkla röjningar. Dessa arter finns inte rapporterade i artportalen 2023, oklart om de finns kvar. Å andra sidan finns inte aklejruta eller lind inrapporterat heller, lind finns.

Förgyllt metallfly är sedan 1993 nationellt utdöd. Piltecknad fältmätare vill ha ängsgläntor i skogsmark med ängsruta. I Skåne bedöms larverna sannolikt kunna leva på aklejruta, vilket den tidigare skötselplanen anger. Ängsruta finns inte registrerad i området men finns på ett flertal lokaler inom 1 mils radie. Aklejruta finns på många platser i närheten, närmast söder om Hallaröd. Arten har tidigare funnits i reservatet. Vasspetsad sickelvinge förekommer i park- och lundskogar med mycket lind (Tilia cordata), vilken utgör larvens föda. I Allarps bjär finns relativt rikligt med lind. Lindmalmätare är inte rödlistad, larverna lever på skogslönn och lind. Skogslönn finns i reservatet, även lind.

Övriga rödlistade arter att ta hänsyn vid skötsel

Alm och ask finns kvar i området, även som större träd men bedöms vara bortom räddning, inga speciella skötselåtgärder bedöms som meningsfulla. Exempelvis skogslönn, ek och bok bedöms kunna fungera som ersättningsträd för lavar och mossor. Hålnunneört kräver halvskuggig, frisk, kalkhaltig mark vilket det också är på toppen av berget där den finns rikligt. Månviol trivs i i näringsrika, fuktiga ängslövskogar, ofta i anslutning till översilningsmarker och alltid i kalktrakter så även i Allarps bjär.

Skogsveronika är bunden till brunjordar med välutvecklade, vattenhållande men luftiga mullager på kalkhaltig mark.

Bokstavsmott Bokstavsmottet var i Sverige vanligt fram till 1950-talet men har därefter gått mycket starkt tillbaka, och är numera näst intill försvunnen från landet. Generellt förekommer den på torra backar med hedkaraktär, rika gräsmarker eller torra ängar. Glimfältmätare vill ha torrängsbackar med tjärblomster. Gulryggig fältmätare förekommer mycket lokalt på rika, men isolerade lundlokaler med springkorn. Springkorn kan ev konkurreras ut av blekbalsamin. Humlerotfjäril vill ha ogödslade slåttermarker eller öppna betesmarker. Ligusterfly uppträder först och främst i ljusa varma ädellövlundar eller andra lövdominerade skogar och i varma brynmarker med ask. Sexfläckig blombock har en larvutveckling som sker i gammal, sedan lång tid tillbaka död, grov ekved som ligger på marken, ofta angripen av svampen rostöra (*Hymenochaete rubiginosa*). Larverna gnager slingrande gångar i den ganska torra, rötade splintveden. Arten ska i Tyskland även vara påträffad på bok, i Skåne främst i skogsbestånd med gamla ekar med nedfallna grövre gren- och stamdelar, oftast i ganska tät,

lundartad skog. Larvutvecklingen sträcker sig över tre år och mer, förpuppningen sker i början av juni och den nykläckta fullbildade skalbaggen besöker blommor under juli. Den påträffas ofta i älggräs (*Filipendula ulmaria*), ängsruta (*Thalictrum flavum*) och strätta (*Angelica sylvestris*). Företrädesvis besöker den blommor som växer i små gläntor i skogen.

Plectophloeus nubigenas biologi är dåligt känd. Arten påträffas i lös ved eller mulm i stubbar, lågor och ihåliga grova, murkna ädellövträd, främst bok men även ek.

Sammanfattningsvis så kan ovanstående arter gynnas av slåtter och att tillgången på död ekved är kontinuerlig, i övrigt är arterna knutna till markens kalkhalt.

Gällande fladdermössen så gynnas alla arter av tillgången till insekter, vatten, sumpskog, kantzoner mellan skog och öppen mark och gammal ädellövsskog. Åtgärder för att öka nektar och pollenproduktionen exempelvis genom att restaurera ängsmark bedöms som en viktig åtgärd.

Delområde 5.1.1 Ädellövskog i branter, 9180, 3,2 ha

Beskrivning

Området med toppen av vulkankäglan och rasbranterna utgörs av ädellövskog av ask, avenbok, alm, fågelbär, lönn och lind med en medelålder på ca 75-125 års ålder. Det finns väldigt mycket död ved (ca 15-40 m3/ha). Det finns också många gamla träd som är senvuxna men det finns endast enstaka grova träd. Bevarandestatusen är fullgod. Växter som lundslok, hålnunneört, träjon, lundgröe, ekorrbär, liljekonvalj, lundarv, buskstjärnblomma, hässlebrodd, löktrav, skogsvicker, stinknäva, ramslök, kransrams, skogsbingel, vitsippa, gulsippa, blåsippa, majsmörblomma, svalört, myskmadra, springkorn, strutbräken, lundelm, lungört, lundarv, buskstjärnblomma, skånsk nunneört, nejlikrot, vårärt, harsyra, skogsbingel, lundviol, gulplister, hässlebrodd och svalört finns på marken och på träden finns mossor och lavar som fjädermossa, klippfrullania, lunglav, porella och skuggsprötmossa.

I området finns fjärilarna vasspetsad sickelvinge och lindmalmätare vilka båda har larver som lever på lind.

Bevarandemål

De bevarandemål som fastställts inom ramen för Natura 2000 skötselplan fastställd 2016-12 anger att det råder gynnsam bevarandestatus när arealen omfattar minst 3,2 ha, idag har området fullgod bevarandestatus.

- Flerskiktad naturskogsliknande ädellövskog bestående av främst av bok, ek, lönn, avenbok, lind och hassel med inslag av lönn, björk och fågelbär.

- Antalet grova träd bör vara minst 20 per hektar.
- Mängden död ved i olika nedbrytningsstadier och olika grovlekar i form av döda träd, högstubbar och lågor ska vara riklig, ett riktvärde bör vara minst 40 m3sk/ha. Tillförseln av död ved bör ligga kring 1-2 m3sk/ha och år.
- Gran ska ej förekomma inom skötselområdet.
- Invasiva och eller främmande arter ska inte förekomma inom skötselområdet.
- Området får vara mycket svårframkomligt, med undantag där leder går.

Arter

- Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. De typiska kärlväxtarterna hålnunneört, vårärt, lungört och skogsbingel finns i området.
- Den typiska lavarten lunglav ska finnas spritt på minst 5 trädstammar i området.
- De typiska mossarterna fjädermossa, porellor, skuggsprötmossa och klippfrullania ska finnas på minst 5 trädstammar i området.
- Fjärilarna i området ska gynnas genom att lind gynnas

Skötselåtgärder

- Om gran skulle växa in i området ska den tas bort.
- Borttagande av invasiva och eller främmande arter.
- Inplantering av hotade arter som lever i andra naturskogsliknade ädellövskogar i Södra Sverige får ske.

Delområde 5.1.2 Näringsrik bokskog, 9130, 24,5 ha

Beskrivning

I nordost består bokskogen av ca 76-125 år gamla träd av bok och avenbok. Här finns också ek och lönn. I söder är bokskogen dock äldre (ca 125-175 år). Bokskogen har måttligt med död ved (ca 5-15 m3/ha) och den döda veden finns både som hålträd och som grova döda delar på träd. Det finns också senvuxna träd. Det finns tämligen allmänt med grova och gamla träd (ca 2-10 träd/ha). Här uppfylls alla kriterier för fullgod bevarandestatus.

Bokskogen är örtrik med en våraspekt bestående av hässlebrodd, lundslok, lundgröe, vispstarr, liljekonvalj, blåsippa, vitsippa, gulsippa, skånsk nunneört, vildkaprifol, vårärt, vårfryle, skogsbingel, lungört, gulplister och myskmadra. Högsommaraspekten består av arter som lundarv, ramslök, lundärt, tandrot, hålnunneört, ekorrbär, harsyra, skogsstarr, hässlebrodd, gulplister, lundslok, myskmadra, springkorn, skogskovall, kransrams, skogsbingel och storrams. Även moss- och lavfloran är artrik med bokvårtlav, bokkantlav, kornig nållav, rosa lundlav, stiftklotterlav, klippfrullania, piskbaronmossa, platt fjädermossa, västlig husmossa, stor bandmossa samt porella sp.

Ett fuktigare parti med yngre ask, avenbok, lönn och al finns insprängt i öster.

I den sydostliga hörnan finns en utvecklingsmark som på sikt utvecklas till örtrik bokskog (9130). Dess areal är 0,64 ha.

Bevarandemål

De bevarandemål som fastställts inom ramen för Natura 2000 skötselplan fastställd 2016-12 anger att det råder gynnsam bevarandestatus när arealen omfattar minst 24,5 ha.

- Flerskiktad naturskogsliknande ädellövskog bestående av främst av bok, ek, lönn, avenbok, lind och hassel med inslag av lönn, björk och fågelbär.
- Antalet grova träd bör vara minst 20 per hektar.
- Mängden död ved i olika nedbrytningsstadier och olika grovlekar i form av döda träd, högstubbar och lågor ska vara riklig, ett riktvärde bör vara minst 40 m3sk/ha. Tillförseln av död ved bör ligga kring 1-2 m3sk/ha och år.
- Gran ska ej förekomma inom skötselområdet.
- Invasiva och eller främmande arter ska inte förekomma inom skötselområdet.
- Området får vara mycket svårframkomligt, med undantag där leder går.
- Skogsduva bör häcka årligen i området.

Arter

- Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. De typiska kärlväxt-arterna lundarv, gulplister, gulsippa, lundslok, tandrot, hålnunneört, myskmadra skogsbingel och storrams har påträffats
- De typiska lavarterna bokkantlav, bokvårtlav, kornig nållav, rosa lundlav samt stiftklotterlav ska var och en finnas på minst 5 trädstammar inom området
- De typiska mossarterna klippfryllania, piskbaronmossa, platt fjädermossa, västlig husmossa och porellor ska var och en finnas på minst 5 trädstammar inom området.

Skötselåtgärder

- Om gran skulle växa in i området ska den tas bort.
- Borttagande av invasiva och eller främmande arter.
- Tillse att uppsatta holkar uppfyller sitt syfte.
- Inplantering av hotade arter som lever i andra naturskogsliknade ädellövskogar i Södra Sverige får ske.



Bild 2 Naturskogskaraktär inom området med mycket död ved.

Delområde 5.1.3 Näringsrik ek- eller ek/avenbokskog, 9160, 0,41 ha

Beskrivning

Centralt i området finns en liten flerskiktad skog med dominans av ek och bok Buskskikt saknas. Medelåldern uppskattas till 126-175 år. Det finns lite med död ved, och det finns också gott om gamla och grova träd. En del grova träd är vidkroniga. Alla kriterier för en fullgod bevarandestatus finns här. Arter som buskstjärnblomma, lundslok, myskmadra, vitsippa, gulplister, grässtjärnblomma och skogsbingel finns i fältskiktet medan träden är bevuxna med lavar och mossor som grov baronmossa, platt fjädermossa, guldlocksmossa, klippfrullania och trädporella.

Bevarandemål

De bevarandemål som fastställts inom ramen för Natura 2000 skötselplan fastställd 2016-12 anger att det råder gynnsam bevarandestatus när arealen omfattar minst 0,41 ha, området har idag fullgod bevarandestatus.

- Flerskiktad ekdominerad ädellövskog bestående av främst av ek med inslag av bok.
- Krontäckningen bör ligga kring 75%.

- Antalet grova träd bör vara minst 10 per hektar.
- Mängden död ved i form av döda träd, högstubbar och lågor ska vara riklig, ett riktvärde bör vara minst 20 kbm/ha. Tillförseln av död ved bör ligga kring 1-2 kbm/ha och år.
- Gran ska ej förekomma inom skötselområdet.
- Invasiva och eller främmande arter ska inte förekomma inom skötselområdet.

Arter

- Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. De typiska kärlväxt-arterna buskstjärnblomma, lundslok, myskmadra, gulplister och skogsbingel finns inom området.
- De typiska moss-arterna baronmossa, grov baronmossa, fjädermossor, platt fjädermossa, guldlocksmossa, klippfrullania, och trädporella ska finnas på minst 5 trädstammar inom området.

Skötselåtgärder

- Om gran skulle växa in i området ska den tas bort.
- Borttagande av invasiva och eller främmande arter.
- Tillse att uppsatta holkar uppfyller sitt syfte.
- Inplantering av hotade arter som lever i andra naturskogsliknade ädellövskogar i Södra Sverige får ske.

Delområde 5.1.4 Nordlig ädellövskog, 9020, 7,5 ha

Beskrivning

Centralt i området finns en flerskiktad skog med dominans av lind men även avenbok, alm, lönn, ask, ek, bok och björk. Buskskiktet består av hassel, rönn, benved och hagtorn m.m. Medelåldern uppskattas till 126-175 år. Det finns mycket rikligt med död ved, delvis av grov dimension och det finns också gott om gamla och grova träd. En del grova träd är spärrgreniga. Alla kriterier för en fullgod bevarandestatus finns här. I nordväst på sluttningen finns avenboksskog av yngre ålder där de grova träden saknas men en stor del träd är senvuxna. Det saknas död ved i större mängd, detta medför att bevarandestatusen här är icke–fullgod. Här finns mycket vildkaprifol samt gulsippa, buskstjärnblomma, skogskovall, springkorn, myskmadra och gulplister.

Arter som finns i den centralt belägna skogen är; buskstjärnblomma, lundslok, myskmadra, humleblomster, grönvit nattviol, träjon, hässlebrodd, lundgröe, liljekonvalj, majsmörblomma, svalört, blåsippa, gulsippa, vitsippa, underviol, lungört, myskmadra, kransrams, gullris, gulplister, grässtjärnblomma och skogsbingel finns i fältskiktet medan träden är bevuxna med mossor som grov baronmossa, platt fjädermossa, guldlocksmossa, klippfrullania, stenporella och trädporella. En rik svampflora förekommer med bl.a. dystersopp, stor stinkbrosking, luden skålsvamp, elfenbensvaxing, avenboksriska och eksopp.



Bild 3 Spännande rakstammiga ekar finns inom området.

Bevarandemål

De bevarandemål som fastställts inom ramen för Natura 2000 skötselplan fastställd 2016-12 anger att det råder gynnsam bevarandestatus när arealen omfattar minst 7,5 ha, området har idag fullgod bevarandestatus.

Flerskiktad linddominerad ädellövskog bestående av främst av lind, ek, avenbok, hassel med inslag av bok, lönn, björk och fågelbär.

- Krontäckningen bör ligga kring 75%.
- Antalet grova träd bör vara minst 20 per hektar.
- Antalet senvuxna träd bör vara minst 5 per hektar.
- Mängden död ved i form av döda träd, högstubbar och lågor ska vara riklig, ett riktvärde bör vara minst 40 kbm/ha. Tillförseln av död ved bör ligga kring 1-2 kbm/ha och år.
- Gran ska ej förekomma inom skötselområdet.
- Invasiva och eller främmande arter ska inte förekomma inom skötselområdet.
- Området får vara mycket svårframkomligt, med undantag där leder går.

Arter

- Det ska finnas minst 2 typiska arter i genomsnitt per provyta. De typiska kärlväxt-arterna underviol, myskmadra, lungört, kransrams och skogsbingel finns inom området.
- De typiska moss-arterna grov baronmossa, platt fjädermossa, klippfrullania, och trädporella ska finnas på minst 5 trädstammar inom området.

Skötselåtgärder

- Om gran skulle växa in i området ska den tas bort.
- Borttagande av invasiva och eller främmande arter.
- Tillse att uppsatta holkar uppfyller sitt syfte.
- Inplantering av hotade arter som lever i andra naturskogsliknade ädellövskogar i Södra Sverige får ske.

Delområde 5.1.5 Svämlövskog, 91E0, 1,5 ha

Beskrivning

Centralt i området finns en flerskiktad alsumpskog med inslag av ask och björk. Det finns bara lite död ved(<5m3/ha) i form av lågor och endast enstaka gamla och grova träd. En viss sockelbildning finns. Buskskiktet består av hassel, ask och brakved. Fältskiktet utgörs av humleblomster, älgört, kärrfibbla, myskmadra, majbräken,

strutbräken och läkevänderot. Bevarandestatusen anses vara fullgod. Inom området finns fjärilarna förgylld metallfly och piltecknad fältmätare som när de är larver har aklejruta som värd. Svampen cinnoberspindling finns också. Ett gammalt dike med synbar påverkan på omkringliggande skog går igenom området.

Söder om den långsmala betesmarken uppe på höjden finns också en svämskog, utanför N2000- området.

Bevarandemål

De bevarandemål som fastställts inom ramen för Natura 2000 skötselplan fastställd 2016-12 anger att det råder gynnsam bevarandestatus när arealen omfattar minst 1,5 ha, området har idag fullgod bevarandestatus.

I svämlövskogar (91E0) ska hydrologin vara ostörd. Vattendraget ska ha god status vad gäller vattenståndsvariationer enligt vattendirektivets bedömningsgrunder.

Arter

Det ska finnas minst två typiska arter i genomsnitt per provyta. De typiska arterna majbräken och strutbräken finns i området.

Skötselåtgärder

Återvätning av skogsmark

En återvätning har genomförts inom svämlövskogen genom pluggning av dike vid markvägen som går upp till betesmarken i skogen.



Bild 4 Aktuellt område som har återvätas.



Bild 5 Fuktig skog med dike där pluggning av dike genomförts.

6.1 Skötselområde – äng

Delområde 6.1.1: Artrik silikatgräsmark, 6270 – 1,1 ha

Delområde 6.1.2: Restaureringsmark äng – 4,9 ha

Areal totalt: 6 ha



Bild 6 Betesmark

6.1.1 Artrika silikatgräsmarker, 6270, 1,1 ha

Beskrivning

I nordväst finns ett torrt-friskt område som tidigare betats som har ängsvegetation. Området var tidigare skog. En svag påverkan från gödsling finns och spår från långvarig tidigare ohävd - igenväxning syns då bl.a. hundkäx och höga gräs har etablerat sig liksom sly och björnbär. Detta gör att bevarandestatusen anses vara icke-fullgod.

Arter som vårbrodd, svartkämpar, ärenpris, kärringtand, prästkrage, gräs(„stjärn-blomma, mandelblom, daggkåpa, teveronika, gökärt, tvåblad samt grönvit nattviol förekommer. Marken är inte stenbunden. Träd av ek, lönn och sälg förekommer rätt sparsamt men en del hålträd av ek och lönn finns. 2022 röjdes området och ett nytt staket sattes upp.

Bevarandemål

De bevarandemål som fastställts inom ramen för Natura 2000 skötselplan fastställd 2016-12 anger att det råder gynnsam bevarandestatus när arealen är minst 1,1 ha, området har idag icke fullgod bevarandestatus.

- Krontäckningen av träd och buskar ska vara mellan 3-5 %. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma.
- Alla grova träd och hålträd i betesmarken ska bevaras.

Arter

- Det ska finnas minst två typiska arter i genomsnitt per provyta. De typiska arterna prästkrage, mandelblom och grönvit nattviol finns i området.

Skötselåtgärder

- Fortsatt bete så att betesmarken hålls öppen.
- Röjningar av sly regelbundet.
- Att gödsling, stödutfodring och annat som tillför näringsämnen till marken inte sker.
- Plantera ut eller så för området naturlig ängsvegetation.
- Ändra fållindelning så att fler blommor kan komma upp i blom.



Bild 7 betesmark på f.d. åker

Delområde 6.1.2 Restaureringsmark äng, 4,9 ha

Beskrivning

Det finns fyra delområden, en betesmark, en före detta äng som varit granplanterade, en liten inäga i norr som varit äng men som på senare år brukats som åker samt en betesmark i söder. Granen höggs ned hösten 1983 och har därefter betats till och från. Det östra området har på senare år brukats som åker med vallinsådd. I den sydöstra kanten finns en betesmark som delvis går in en bit in i skogen. I norr finns en liten inäga, fd äng som brukats som åker med vallinsådd.

2023 var första året som vallarna inte skördades och på sensommaren inventerades områdena, artlistan finns i Artportalen. I det östra området fann man 32 st olika kärlväxter och den lilla inägan i norr 14 st, de flesta blommande.

Bevarandemål

Ängsmark med blommande ängsväxter som betas eller slåttras sent på säsongen för att gynna pollinatörer och vidare fladdermöss. Enstaka trädsolitärer får finnas. Träd

längs med stenmurarna bevaras. Flerskiktade bryn med blommande buskar ska eftersträvas. Så många för området naturlig förekommande blommande arter som möjligt.

Skötselåtgärder

- Slåtter el bete, sent på säsongen för att förhindra igenväxning samt för att magra ur markerna. Slåttern behöver inte ske varje år.
- Inplantering el insådd av naturligt för området förekommande ängsväxter och blommande buskar och träd.

Delområde 6.2 Friluftsliv

Beskrivning

Allarps bjär ligger ca 1mil NV om Höörs centrum i Hallaröds socken. I reservatets nordöstra del finns en parkeringsplats för ca 10 bilar i anslutning till vägen från Hallaröd. Parkeringsmöjligheter finns också i anslutning till det närliggande naturreservatet Södra Hultarp. P-platsernas läge framgår av karta E. Skåneleden, delen "Från ås till ås", passerar genom reservatet och är utmärkt i terrängen med orange färg, övriga stigar inom området är inte markerade utan anges enbart på informationstavlorna. Skåneledens och övriga huvudstigars sträckning framgår av karta E. Informationsskyltar om reservatet och dess naturvärden finns vid parkeringsplatserna. Informationen är samordnad med den som rör naturreservatet Södra Hultarp. En mullestig finns inom området med QR-kod.

Bevarandemål

Reservatet ska med enkla anordningar tillgängliggöras för friluftslivet.

Skötselåtgärder

- Underhåll av parkeringsplatser.
- Underhåll av Skåneleden, Höörs kommun ansvarar.
- Underhåll av Mulleslingan.
- Underhåll av stättor till betesmark.
- Underhåll av räcke upp till toppen av käglan.
- Underhåll av informationstavlor.
- Underhåll av skylt Karrastenen.

7 Jakt

Jakt är inte tillåtet på lördagar samt sön- och helgdagar. Det är förbjudet att uppföra byggnad eller annan anläggning.

8 Utmärkning av naturreservatets gränser

Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om bildande av naturreservat har vunnit laga kraft. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov. Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar.

9 Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet.

10 Dokumentation och uppföljning

10.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av skötselåtgärder.

Vegetationsuppföljning

För uppföljning och övervakning av vegetationsutvecklingen inom området bör ett antal fasta provytor etableras inom särskilt utvalda partier. Ett särskilt uppföljningsprogram bör utarbetas för att kunna följa upp den uppföljning som gjordes i meddelande 1981:3 Allarps berg, Länsstyrelsen Malmöhus län, ISSN 0349-1420, författare Torleif Bramryd och Leif Unosson.

Faunauppföljning

Barbastell och Bechsteins fladdermus

En fortsatt biogeografisk uppföljning av fladdermöss behöver göras regelbundet. Senast man gjorde en uppföljning var 2016-2021.

10.2 Revidering av skötselplanen

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att skötselåtgärder måste anpassas efter ny kunskap.

11 Kostnadsansvar och prioriteringar

Om det utgår annan statlig ersättning för skötsel av marker, till exempel miljöersättning, ersättning för restaurering etcetera kan inte föreslagna skötselåtgärder (eller motsvarande åtgärder) utföras eller finansieras av reservatsförvaltningen.

Tabell 2. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering inom intervall 1–3 där 1 är högsta prioritet att genomföra.

Markskötsel

Skötselåtgärd	Tidpunkt	Skötselområde	Kostnads- och åtgärdsansvarig	Prioritet	Upplysningar
Slåttra/bete	Löpande	Äng kap.6.1	Förvaltaren	1	0
Lägga igen diken enl hydrologisk undersökning	Snarast, därefter vid behov (ca 10 år)	Svämlövskog kap 5.1.5	Förvaltaren	1	0
Röjning av gran	Vid behov	Hela området	Förvaltaren	2	2023 inga granar. Motormanuellt

Anläggningar

Underhåll av parkeringsplats	Vid behov	Enligt bilaga E	Skötselavtal finns	1	0
Restaurering och underhåll av ledstång upp till toppen	Vid behov	Enligt bilaga E	Förvaltaren	1	0
Underhåll av informationsskyltar	Löpande	Enligt bilaga E	Förvaltaren	1	0

Underhåll av gränsmarkering	Vid behov	Hela området	Förvaltaren	1	Gjort 2021
Underhåll av Mulleslingan	Löpande	Enligt bilaga E	Förvaltaren	1	0
Underhåll av Skåneleden markeringar	Löpande	Enligt bilaga E	Höörs kommun	2	0

12 Rödlistade arter



Mossor

Stor bandmossa	*Metzgeria conjugata*	NT

Lavar

Askvårtlav	*Pyrenula nitidella*	EN
Blek kraterlav	*Gyalecta flotowii*	VU
Bokkantlav	*Lecanora glabrata*	NT
Bokvårtlav	*Pyrenula nitida*	NT
Klosterlav	*Biatoridium monasteriense*	NT
Liten ädellav	*Megalaria laureri*	EN
Lunglav	*Lobaria pulmonaria*	NT
Rosa lundlav	*Bacidia rosella*	VU
Stiftklotterlav	*Opegrapha vermicellifera*	NT

Kärlväxter

Ask	*Fraxinus excelsior*	EN

Gullpudra	*Chrysosplenium alterni-folium*	NT
Hålnunneört	*Corydalis cava*	NT
Skogsveronika	*Veronica montana*	NT
Skogsalm	*Ulmus glabra*	EN
Vårärt	*Lathyrus vernus*	NT

Svampar

Koralltaggsvamp	*Hericium coralloides*	NT
Kortfotkremla	*Russula curtipes*	NT
Oxtungssvamp	*Fistulina hepatica*	NT
Skarp rökriska	*Lactarius acris*	NT
Skillerticka	*Inonotus cuticularis*	VU
Stinklerskivling	*Hodophilus foetens s.lat.*	NT
Sydlig sotticka	*Ischnoderma resinosum*	NT

Fåglar

Björktrast	*Turdus pilaris*	NT
Blå kärrhök	*Circus cyaneus*	VU
Entita	*Poecile palustris*	NT
Grönsångare	*Phylloscopus sibilatrix*	NT
Mindre hackspett	*Dryobates minor*	NT

Fjärilar

Bokstavsmott	*Diasemia reticularis*	VU
Glimfältmätare	*Perizoma hydrata*	NT
Gulryggig fältmätare	*Ecliptopera capitata*	VU
Humlerotfjäril	*Hepialus humuli*	NT

Skalbaggar

Plectophloeus nubigena	*Plectophloeus nubigena*	NT

Fladdermöss

Barbastell	*Barbastella barbastellus*	NT
Bechsteins fladdermus	*Myotis bechsteinii*	CR
Fransfladdermus	*Myotis nattereri*	NT
Nordfladdermus	*Eptesicus nilssonii*	NT
Nymffladdermus	*Myotis alcathoe*	NT
Brunlångöra	*Plecotus auritus*	NT

Blötdjur

Svart skogssnigel	*Arion ater ater*	NT

13 Källor

13.1 Litteratur

Allarps berg, meddelande 1981:3, Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Artdatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Artportalen www.artportalen.se - Artdatabankens artfaktablad http://www.art-data.slu.se

Beslut Allarps berg, 1984-03-13, Länsstyrelsen Malmöhus län

Fakta skog 1, 2008, SLU, Gunnar Isacsson, Jörg Brunet

Fakta skog 12, 2008 SLU, Örjan Fritz

Inventering 2023, Joakim Kronvall och Henrik Jönsson, Hvilas utbildning

Länsstyrelsen i Malmöhus län. 1981. Allarps berg. Naturvårdsundersökning av Allarps Berg.

Naturskyddsföreningen Skåne. 2026. https://skane.naturskyddsforeningen.se/allarps-berg/

Nitare, J. (red.), 2010. Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping.
Skötselplan Allarps bjär 1989-06-20, Länsstyrelsen Malmöhus län

Skåneleden. 2026. https://skaneleden.se/plats/bevarade-lavafloden-vid-allarps-bjar

Skånes nordvästpassage 2026. https://skanes-nordvastpassage.se/allarps-bjar/

Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län, Länsstyrelsen i Skåne län, rapport 2006:1

Åtgärdsprogram för barbastell, 2015–2019. Naturvårdsverket, Stockholm

13.2 Kartor

Generalstabskartan 1965, Lund 5-1, Rikets allmänna kartverks arkiv Lagaskifte 1835, Lantmäteristyrelsens arkiv

Häradsekonomiska kartan, Höör 1-20, Rikets allmänna kartverks arkiv


Övriga kartor och bakgrundskartor, Lantmäteriet. © Lantmäteriet geodatasamverkan

Geometrisk karta 1719

Ekonomisk karta 1917

Bilagor

A. Skötselområdeskarta
B. Fornlämningar
C. Teckenförklaring N2000
D. Livsmiljötypskarta N2000
E. Friluftslivskarta



Bilaga A, Skötselområdeskarta
Naturreservatet Allarps bjär, Höörs kommun

Länsstyrelsen Skåne

Legend

Skötselområden


- Ädellövskog i branter
- Restaureringsmark äng
- Silikatgräsmark
- Svämlövskog
- Nordlig ädellövskog
- Näringsrik bokskog
- Näringsrik ekskog
- Naturreservatets gräns

N

0 100 200 300 Meter

Illustrationskarta till skötselplan för naturreservatet Allarps bjär
Tillhör Länsstyrelsens beslut
511-14643-2023

© Länsstyrelsen Skåne
© Lantmäteriet Geodatasamverkan



Bilaga B, Fornlämningar Naturreservatet Allarps bjär, Höörs kommun

Länsstyrelsen Skåne

- Naturreservatets gräns
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning

N

0 50 100 150 Meter

Illustrationskarta till beslut för naturreservatet Allarps bjär
Tillhör Länsstyrelsens beslut
dnr 511-14643-2023

© Länsstyrelsen Skåne
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga C, Livsmiljötypskoder för kartan

Natura 2000-livsmiljötyper

6270 - Silikatgräsmarker

9020 – Nordlig ädellövskog

9130 – Näringsrik bokskog

9160 – Näringsrik ekskog

9180 – Ädellövskog i branter

9750, 91E0 - Svämlövskog

Icke-livsmiljötyper

6930 - Åker

906 - Triviallövskog

910 - Hygge

9900 – Ickenatura-skog


Bilaga D Livsmiljötypskarta N2000

Natura 2000-området Allarps Bjär
SE0430179 med livsmiljötyper

Förteckning över livsmiljötyper återfinns i bilaga 2

Karta 1 av 1





Bilaga E, Friluftslivskarta
Naturreservatet Allarps bjär, Höörs kommun

Länsstyrelsen Skåne


- Karrastenen
- Informationsskylt
- P-plats
- Utsiktsplats
- Skåneleden
- Naturreservatets gräns

N

0 50 100 150 Meter

Illustrationskarta till skötselplan för naturreservatet Allarps bjär
Tillhör Länsstyrelsens beslut
dnr 511-14643-2023

© Länsstyrelsen Skåne
© Lantmäteriet Geodatasamverkan



Länsstyrelsen
Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane